

FICHA TÉCNICA

1. Producto:

Nombre: **MASSO-MYC®**

2. Número de registro:

F0005444/2032 (España)

3. Contenidos declarados:

ABONO CON MICROORGANISMOS	
<i>Rhizopagus Irregularis</i> cepa MUCL 057891 .	100 esporas/g
Hierro (Fe) soluble en agua y quelado por HBED	4,5 % p/p
Manganeso (Mn) soluble en agua y quelado por EDTA	1 % p/p
Zinc (Zn) soluble en agua y quelado por EDTA	0,9 % p/p
Intervalo de pH que garantiza una buena estabilidad de la fracción quelada: 3,5-10.	

4. Formulación:

Polvo soluble en agua.

5. Características:

MASSÓ-MYC es una formulación sólida a base de micronutrientes con micorrizas de alta solubilidad para aplicación radicular. Su equilibrada composición a base de micronutrientes quelados favorece la rápida asimilación de estos debido a que no reaccionan con otros compuestos del suelo, permitiendo la absorción por parte del cultivo de una manera rápida y eficaz. Además, las micorrizas contenidas en la formulación, permiten el establecimiento de una relación simbiótica con las raíces del cultivo potenciándose el crecimiento radicular y la absorción de nutrientes.

6. Dosis y modo de empleo:

MASSÓ-MYC debe ser disuelto en agua y aplicado vía riego o inyección en los siguientes cultivos y siguiendo las recomendaciones que se exponen a continuación:

Cultivos	Dosis (Kg/ha)	Momento de aplicación
Cultivos leñosos (cítricos, olivo, frutales, almendro, nogal, pistachero, vid, aguacate, etc.)	2-4	Realizar 1 aplicación en la brotación.
Cultivos hortícolas (tomate, ajo, cebolla, berenjena, calabacín, pimiento, pepino, fresa, melón, sandía, etc.)	2-4	Realizar 1 aplicación al trasplante.

Para un uso sostenible del producto, la dosis y nº de aplicaciones indicadas va sujeta al plan de fertilización del cultivo. No existen limitaciones de uso

7. Presentación:

Envases de 1 y 5 Kg

8. Precauciones:

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P270 No comer, beber, ni fumar durante su utilización.

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

Contiene microorganismos. Puede provocar reacciones de sensibilización. Se recomienda la utilización de equipo de protección respiratoria (respirador desechable o careta filtrante, al menos EN 149 FFP3 o equivalente) al manipular el preparado o aplicar el producto.

9. Incompatibilidades:

Es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios y fertilizantes, pero se recomienda no aplicar fósforo hasta 15 días después del tratamiento con MASSÓ-MYC para un buen establecimiento de la micorriza.

10. Fecha de caducidad:

1 año después de la fecha de fabricación.

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.