

FICHA TÉCNICA

1. Producto:

Nombre: **FOLPERAN WG**

2. Número de registro:

19.994

Denominación común:

FOLPAN 80 WG.

3. Composición:

Folpet 80% p/p (800g/kg).

4. Formulación:

Granulo dispersable en agua (WG).

5. Descripción:

Fungicida orgánico en forma de granulado dispersable.

6. Clasificación toxicológica:



PELIGRO

H315 Provoca irritación cutánea. **H317** Puede provocar una reacción alérgica en la piel. **H319** Provoca irritación ocular grave. **H330** Mortal en caso de inhalación. **H351** Se sospecha que provoca cáncer. **H372** Provoca daños en las vías respiratorias tras exposiciones prolongadas o repetidas. **H410** Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. **P201+P202** Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. **P261** Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. **P273** Evitar su liberación al medio ambiente. **P280** Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. **P302+P352** EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. **P304+P340** EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. **P305+P351+P338** EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. **P391** Recoger el vertido. **P403+P233** Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. **P405** Guardar bajo llave. **P501** Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

7. Presentación:

Envases de 5 Kg

8. Aplicaciones autorizadas, dosis y modo de empleo:

Tratamientos fungicidas en cultivos y plantaciones agrícolas de:

Cultivos	Plagas	Dosis g/hl	Condicionamientos	P.S (*)
TOMATE	Fusariosis (<i>Fusarium spp.</i>), alternaria de las solanáceas (<i>Alternaria solani</i>), antracnosis del tomate (<i>Colletotrichum coccodes</i>), <i>Botrytis spp.</i> , mildiu de la patata y el tomate (<i>Phytophthora infestans</i>)	200	Aplicar mediante pulverización normal con tractor al aire libre o manual en invernadero (para fusarium aplicar en el cuello de la planta). Realizar una única aplicación con un máximo de 1,55 kg/ha en aire libre y 2,0 kg/ha en invernadero. En aire libre, aplicar desde la formación del fruto y en invernadero no aplicar cuando el cultivo tenga más de un metro de altura.	10
PATATA	Fusariosis (<i>Fusarium spp.</i>), alternaria de las solanáceas (<i>Alternaria solani</i>), antracnosis (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>), mildiu de la patata y el tomate (<i>Phytophthora infestans</i>)	200	Aplicar mediante pulverización normal con tractor (para fusarium aplicar en el cuello de la planta). Realizar un máximo de 3 aplicaciones con un intervalo de 7 a 10 días entre las mismas con un máximo de 1,55 kg/ha y tratamiento y 2,5 kg/ha por campaña.	14
VID DE MESA	Black rot, podredumbre negra de la vid, (<i>Phyllosticta ampellicida</i>), <i>Botrytis spp.</i> , cicatrización de heridas de granizo, mildiu de la vid (<i>Plasmopara viticola</i>)	250	Aplicar mediante pulverización normal con tractor. Realizar un máximo de 3 aplicaciones en prefloración (antes de BBCH 60), con un intervalo de 7 a 10 días entre las mismas, con un máximo de 2 Kg/ha y tratamiento y un máximo de 3,2 Kg/ha por campaña.	NP
VID DE VINIFICACIÓN	Black rot, podredumbre negra de la vid, (<i>Phyllosticta ampellicida</i>), <i>Botrytis spp.</i> , cicatrización de heridas de granizo, mildiu de la vid (<i>Plasmopara viticola</i>)	250	Aplicar mediante pulverización normal con tractor. Realizar un máximo de 3 aplicaciones con un intervalo de 7 a 10 días entre las mismas con un máximo de 1,8 Kg/ha y tratamiento y 3,2 Kg/ha por campaña.	28
ROSALES	Antracnosis del rosal (<i>Elsinoë rosarum</i>)	200	Aplicar mediante pulverización normal con tractor al aire libre o manual en invernadero. Realizar una única aplicación con un máximo de 2 kg/ha. En invernadero no aplicar cuando el cultivo tenga más de un metro de altura.	NP
ORNAMENTALES HERBÁCEAS, PALMÁCEAS, ARBUSTOS Y PEQUEÑOS ÁRBOLES ORNAMENTALES	Mildius de la familia <i>Peronosporaceae</i> , fialofora (<i>Phialophora spp.</i>), fusariosis (<i>Fusarium spp.</i>), <i>Alternaria spp.</i> , <i>Botrytis spp.</i> , <i>Cladosporiosis</i> (<i>Cladosporium spp.</i>)	200	Aplicar mediante pulverización normal con tractor al aire libre o manual en invernadero. Para fialofora o fusariosis aplicar al cuello de la planta. Realizar una única aplicación con un máximo de 2 kg/ha. En invernadero no aplicar cuando el cultivo tenga más de un metro de altura.	NP
CONÍFERAS Y FRONDOSAS (AMBAS EXCLUSIVAMENTE PARA USO ORNAMENTAL)				

*(P.S) plazo de seguridad (días).

9. Observaciones:

No autorizado para uso profesional en lugares destinados al público en general (plantas ornamentales y leñosas, chopo, álamo y rosál), en cumplimiento con el artículo 49.4 del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de productos fitosanitarios.

Clasificación del modo de acción de las sustancias activas según FRAC:

GRUPO	M04	FUNGICIDA
--------------	------------	------------------

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.