

FICHA TÉCNICA

1. Producto:

Nombre: **WELGRO® BORO SG**

2. Número de registro:

Abono CE- no procede

3. Contenidos declarados:

**ABONO INORGÁNICO SIMPLE A BASE DE MICRONUTRIENTES - CFP1 (C)(II)(a)
ABONO DE UN MICRONUTRIENTE EN FORMA DE SAL: BORATO SÓDICO**

Boro (B) (sodio) soluble en agua

18 % p/p (180g/kg)

4. Formulación:

Granulo soluble en agua.

5. Lista de ingredientes:

Pentaborato de sodio (n° CAS 12007-92-0) (CMC1: Sustancias y mezclas de materiales vírgenes).

6. Características:

WELGRO® BORO SG, a base de pentaborato sódico, es un corrector de carencias de boro para prevenir o corregir las deficiencias de este elemento. El producto puede aplicarse disuelto en agua mediante pulverización foliar o al suelo.

7. Dosis y modo de empleo:

WELGRO® BORO SG puede aplicarse en una gran variedad de cultivos, tanto arbóreos como herbáceos. La aplicación es más necesaria en zonas o terrenos deficitarios en boro, así como en cultivos muy exigentes en este elemento. Se aplica preferentemente en primavera o en periodos de crecimiento activo de las plantas, así como cerca de la floración, ya que favorece la fecundación de la flor (cuajado).

CULTIVO	DOSIS (g/hl)	MOMENTO DE APLICACIÓN
VID	200 – 250	Dos aplicaciones en pre-floración cada 8-10 días
OLIVO	200 – 400	20-30 días antes de la floración
FRUTALES DE HUESO	150 – 250	2-3 tratamientos en pre o post floración
MANZANA Y PERAL	100 – 200	Yemas abiertas
	150	Floración
	150 – 200	Cuajado y fruto joven
KIWI	150- 200	-
CASTAÑO	200	Si el producto se aplica al suelo, la dosis a utilizar será 3-5 kg/ha (100 g/árbol)
REMOLACHA	1kg/ha	2-3 aplicaciones cuando aparezcan las primeras hojas verdaderas
ALGODÓN	500	Cada 20-30 días
HORTÍCOLAS	150 – 250	Cuando se manifieste la carencia
FRESAS Y BAYAS PEQUEÑAS	150 – 250	Cuando se manifieste la carencia
FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALES	150 – 200	Cuando se manifieste la carencia
ALFALFA	500 (1-2 kg/ha)	Después de cada corte
RIEGO POR GOTEO	Aplicar a dosis de 2-3 kg/ha por aplicación	

8. Presentación:

Envases de 1Kg y 5 Kg.

9. Clasificación toxicológica:



ATENCIÓN

CONTIENE PENTABORATO SÓDICO.

H361d: Se sospecha que daña al feto.

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.

P201: Pida instrucciones especiales antes de usar.

P202: No manipule la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.

P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización.

P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

P308+P313: EN CASO DE exposición manifiesta o presunta, consulte a un médico.

P405: Guardar bajo llave.

P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, con arreglo a la normativa local, regional y/o internacional.

10. Condiciones de almacenamiento:

Consérvese únicamente en el envase de origen, en lugar fresco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y luz solar directa. Temperatura de almacenamiento de entre 5 y 35°. Evítese el contacto con ácidos y bases fuertes. Los envases parcialmente usados o dañados deben cerrarse correctamente.

11. Compatibilidad:

WELGRO® BORO SG no puede mezclarse con aceites, polisulfuro de cal, SO_4Mn , SO_4Zn , ni productos alcalinos. Para casos especiales consultar.

**UTILÍCESE SOLAMENTE EN CASO DE RECONOCIDA NECESIDAD.
NO SOBREPASAR LAS DOSIS RECOMENDADAS.**

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.