

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

FRUIT FIX® PLUS

NÚMERO DE REGISTRO

24.393

COMPOSICIÓN

1-Naftilacético 10% p/v (100 g/l)

FORMULACIÓN

Concentrado soluble (SL).

DESCRIPCIÓN

Fitorregulador para manzano y peral.

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA



PELIGRO

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H361d Se sospecha que daña el feto.

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

P260 No respirar la niebla, los vapores.

P280 Llevar guantes, prendas y gafas de protección.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P201+P202 Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

PRESENTACIÓN

Envase de 500ml.

APLICACIONES AUTORIZADAS

FRUIT FIX® PLUS es un preparado totalmente soluble en agua, que interviene de forma activa sobre los procesos involucrados en la abscisión del fruto. Dicho proceso tiene lugar mediante la formación de capas de células especializadas en asegurar la conexión entre el fruto y la planta. Aplicado inmediatamente después del cuajado del fruto, la auxina promoverá su abscisión pero, si se aplica más tarde, tenderá a retrasar la abscisión del fruto evitando su caída.

El uso de **FRUIT FIX® PLUS** está autorizado en manzano (para el aclareo de frutos), y en manzano y peral (para evitar caída del fruto).

FICHA TÉCNICA

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

FRUIT FIX® PLUS se aplicará en pulverización con tractor mojando bien los frutos. El tratamiento se efectuará cuando la temperatura sea de 15 a 25° C y se evitará la presencia de rocío así como las horas de calor fuerte.

Manzano, para aclareo de frutos: Realizar una aplicación a dosis de 10-15 ml/hl con un volumen de agua de 1000 l/ha (máximo 0,15 l/ha), cuando los frutos tengan un diámetro de 8-12 mm (BBCH 71), aproximadamente 15-21 días después de la plena floración.

Plazo de seguridad: NP.

Manzano y peral, para evitar la caída del fruto: Aplicar a dosis de 10-15 ml/hl con un volumen de agua de 1000 l/ha (máximo 0,15 l/ha). Realizar la primera aplicación aproximadamente 14 días antes de la cosecha y una segunda aplicación máximo 7 días antes de la cosecha. Durante la aplicación, deben pulverizarse bien los tallos de los frutos así como los orificios de los tallos. Aplicar el producto sobre cultivos secos, sin que se prevea lluvia con inmediatez. Aplicar preferiblemente durante la tarde de días calurosos.

Plazo de seguridad: 7 días.

PRECAUCIONES

Si no se tiene experiencia con **FRUIT FIX® PLUS** o productos similares, consúltese con el Servicio Técnico de la empresa.

EL PREPARADO NO SE USARÁ EN COMBINACIÓN CON OTROS PRODUCTOS.

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.