

FICHA TÉCNICA

1. Producto:

Nombre: **WELGRO® FRUIT**

2. Número de registro:

Abono CE- no procede

3. Contenidos declarados:

ABONO INORGÁNICO SÓLIDO COMPUESTO A BASE DE MACRONUTRIENTES - CFP1 (C)(I)(a)(ii)
ABONO MINERAL NPK 18-9-28 CON MICRONUTRIENTES: BORO (B), HIERRO (Fe),
MANGANESO (Mn), MOLIBDENO (Mo) Y ZINC (Zn)
ABONO PARA APLICACIÓN FOLIAR EN FORMA DE CRISTALES SOLUBLES EN AGUA

Nitrógeno (N) total	18 % p/p
Nitrógeno (N) nítrico	8,1 % p/p
Nitrógeno (N) amoniacal	1,8 % p/p
Nitrógeno (N) ureico	8,1 % p/p
Pentóxido de fósforo (P ₂ O ₅) total	9 % p/p
Pentóxido de fósforo (P ₂ O ₅) soluble en agua	9 % p/p
Pentóxido de fósforo (P ₂ O ₅) soluble en citrato amónico neutro	9 % p/p
Óxido de potasio (K ₂ O) soluble en agua	28 % p/p
Boro (B) soluble en agua	0,02 % p/p
Manganeso (Mn) quelado por EDTA y soluble en agua	0,13 % p/p
Hierro (Fe) quelado por EDTA y soluble en agua	0,52 % p/p
Manganeso (Mn) quelado por EDTA y soluble en agua	0,12 % p/p
Molibdeno (Mo) (amonio) soluble en agua	0,005 % p/p
Zinc (Zn) quelado por EDTA y soluble en agua	0,05 % p/p

Agente quelante: EDTA

Intervalo de pH que garantiza una estabilidad aceptable de la fracción quelada: 3-6.

4. Formulación:

Polvo soluble en agua.

5. Lista de ingredientes:

Nitrato potásico (nº CAS 7757-79-1) (CMC1: Sustancias y mezclas de materiales vírgenes), Urea cristalina (nº CAS 57-13-6) (CMC1), Fosfato monoamónico (nº CAS 7722-76-1) (CMC1)

6. Granulometría:

Polvo. El 90 % del producto pasa por un tamiz de 1mm

7. Características:

WELGRO® FRUIT es un fertilizante foliar cristalino, soluble en agua y de alta concentración. Su fórmula equilibrada y los microelementos quelatados que contiene constituyen un alimento completo para la planta.

WELGRO® FRUIT puede aplicarse a todo tipo de cultivos como frutales, cítricos, viñedo, hortalizas, ornamentales, olivo, etc.

Está especialmente indicado para mejorar la calidad y rendimiento de los cultivos.

8. Dosis y modo de empleo:

Tomates, berenjenas y otras hortalizas: realizar dos tratamientos antes de la floración y dos postflorales a razón de 200-250 g por 100 litros de agua.

- Frutales, cítricos y florales: aplicar en intervalos de 15 días a la dosis de 150-200 g/100 l.

- Vid y cultivos varios: aplicar a 1-2 Kg/ha según desarrollo vegetativo.

- Olivo: aplicar en brotación, inicio de floración y endurecimiento del hueso a 300-500 g/100 l.

9. Presentación:

Envases de 1 Kg

10. Clasificación toxicológica:

P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.

P103 - Leer atentamente y seguir todas las instrucciones.

P270 - No comer, beber ni fumar durante su utilización.

P280 - Llevar ropa de protección.

Este abono contiene urea, que puede liberar amoníaco y tener repercusiones en la calidad del aire. Dependiendo de las condiciones locales, se deben tomar las medidas correctoras apropiadas. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso.

11. Condiciones de almacenamiento:

Almacene el producto en un espacio seco y bien ventilado alejado de la luz solar directa. Los envases parcialmente usados deben cerrarse correctamente.

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.