

## FICHA TÉCNICA

### 1. Producto:

Nombre: **AMCOTONE®**

### 2. Número de registro:

**22.541**

Denominación común:

**AGRITONE®**

### 3. Composición:

0,43% p/p (4,3 g/kg) ANA + 1,18% p/p (11,8 g/kg) ANA-AMIDA

### 4. Formulación:

Polvo mojable (WP).

### 5. Descripción:

AMCOTONE® es una asociación de fitorreguladores que, una vez aplicado, actúa como inductor de cuaje en distintos cultivos hortícolas y frutícolas. Igualmente se emplea para superar estados críticos durante el crecimiento, así como estimulante frente a condiciones desfavorables (heladas, fitotoxicidades, etc.).

### 6. Clasificación toxicológica:



H319 Provoca irritación ocular grave.

P260 No respirar la niebla.

P280 Llevar guantes y prendas de protección.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado

**ATENCIÓN**

## 7. Presentación:

1 Kg

## 8. Aplicaciones autorizadas, dosis y modo de empleo:

Aplicación en frutales al aire libre mediante pulverización foliar con tractor. En berenjena y tomate en invernadero, mediante lanza/pistola o mochila o mediante riego por goteo. Tratar solamente plantas en buenas condiciones sanitarias. No tratar con temperaturas extremas. Tratar a favor del viento.

| CULTIVO                                                                                                                             | AGENTE                                                | DOSIS (Kg/ha)                              | Nº APLICACIONES                      | INTERVALO (días) | VOLUMEN DE CALDO                                   | FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN                                                                                                                                                                                  | P.S                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Tomate y berenjena (invernadero)                                                                                                    | Estimular la floración (inducir el cuajado de flores) | 0,6 pulverización.<br>1,5 riego por goteo. | 1 pulverización<br>6 riego por goteo | 8-10             | Pulverización: 600 l/ha.<br><br>Goteo: 40.000 l/ha | Uso en invernadero. Aplicación mediante lanza/pistola o mochila o mediante riego por goteo. Realizar la primera aplicación al inicio de la floración, y repetir a los 8 – 10 días cuando ésta sea escalonada | 3 pulverización.<br><br>1 goteo. |
|                                                                                                                                     | Estimular actividad vegetativa                        |                                            |                                      |                  |                                                    |                                                                                                                                                                                                              |                                  |
| Frutales de hueso (melocotonero, nectarino, ciruelo y endrino; en endrino, únicamente para tratamiento a plantaciones comerciales): | Estimular la floración (inducir el cuajado de flores) | 0,6                                        | 1                                    | -                | 1.000 l/ha                                         | Uso al aire libre. Aplicaciones mediante pulverización foliar con tractor. Aplicar el producto de 10 a 15 días antes del inicio de floración; desde estadio de balón (BBCH 59).                              | 90                               |
|                                                                                                                                     | Estimular actividad vegetativa                        |                                            |                                      |                  |                                                    |                                                                                                                                                                                                              |                                  |

| CULTIVO                                                       | AGENTE                         | DOSIS<br>(Kg/ha) | Nº<br>APLICACIONES | INTERVALO<br>(días) | VOLUMEN<br>DE CALDO | FORMA Y ÉPOCA<br>DE APLICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                             | P.S |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Frutales de pepita<br>(manzano, peral, membrillero y níspero) | Evitar caída fruto             | 0,6              | Máx. 4             | 8-10                | 1.000 l/ha          | Uso al aire libre. Aplicaciones mediante pulverización foliar con tractor. Aplicar de 10 a 15 días antes del inicio de floración para evitar la caída del fruto. Para estimular la actividad vegetativa, aplicar después de períodos desfavorables para el cultivo (heladas, vientos,...). | 14  |
|                                                               | Estimular actividad vegetativa |                  |                    |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |

**Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.**