

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

BANDERA®

NÚMERO DE REGISTRO

24.658

COMPOSICIÓN

Nicosulfuron, 4% p/v (40 g/l)

FORMULACIÓN

Dispersión oleosa (OD).

DESCRIPCIÓN

BANDERA® es un herbicida sistémico que es absorbido por las hojas transportándose tanto por el floema como por el xilema hasta los tejidos meristemáticos.

Actúa impidiendo la reacción de la acetolactosintetasa, deteniendo la división celular y el crecimiento de la planta. En el cultivo del maíz, en post-emergencia (a partir del estado de 3-4 hojas), actúa contra malas hierbas anuales gramíneas y dicotiledóneas, así como contra cañota (*Sorghum halepense*) en post-emergencia temprana de la misma. Presenta un efecto complementario contra juncia (*Cyperus* sp.).

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA



H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

P261 Evitar respirar los vapores.

P280 Llevar guantes y prendas de protección.

P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P391 Recoger el vertido.

P501 Elimínense el contenido y/o el recipiente de acuerdo con la normativa de residuos peligrosos.

ATENCIÓN

PRESENTACIÓN

Envases de 1 y 5L.

FICHA TÉCNICA

APLICACIONES AUTORIZADAS DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicar en pulverización con tractor desde el estadio de 3 o 4 hojas, desplegadas (BBCH 13) procurando no sobrepasar el estadio de 8 o 9 o más hojas, desplegadas (BBCH 19).

Cultivos	Plagas	Dosis	Nº Aplicac.	Intervalos	Volumen caldo	Condiciona- mientos	P.S
Maíz	Malas hierbas anuales	1l/ha	1	-	200 – 400 l/ha	También en maíz forrajero	NP
	Sorghum Halepense	Ver condicio- na- mientos	2	10		Primera aplicación: 1l/ha Segunda aplicación: 0,5l/ha También en maíz forrajero	

CONDICIONAMIENTO FITOTERAPÉUTICO

BANDERA® se aplica en pulverización con tractor en post-emergencia temprana. En rotación de cultivos, se pueden sembrar cultivos de otoño (trigo, cebada o guisantes), pero no sembrar colza como cultivo siguiente en la rotación.

OBSERVACIONES

Si se han utilizado insecticidas de suelo organo-fosforados en el momento de la siembra, la aplicación de **BANDERA®** puede originar alguna clorosis en las hojas de maíz. No aplicar ningún insecticida organo-fosforado por vía foliar 7 días antes o después del tratamiento con **BANDERA®**.

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.