

## FICHA TÉCNICA

### 1. Producto:

Nombre: **BLANCADO® WG**

### 2. Número de registro:

19.995

### 3. Composición:

Captan 80% p/p (800 g/Kg)

### 4. Formulación:

Granulado dispersable (WG)

### 5. Descripción:

Fungicida de amplio espectro con actividad preventiva y también para cicatrización de heridas.

### 6. Clasificación toxicológica:



**PELIGRO**

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
H319 Provoca irritación ocular grave.  
H331 Tóxico en caso de inhalación.  
H351 Se sospecha que provoca cáncer.  
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.  
P201+P202 Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.  
P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.  
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.  
P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.  
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.  
P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.  
P405 Guardar bajo llave.  
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.  
P391 Recoger el vertido.

P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.  
El preparado no se usará en combinación con otros productos.  
UFI: KET1-VHS1-AU08-8F7W

## 7. Presentación:

Envase de 3 Kg.

## 8. Aplicaciones autorizadas, dosis y modo de empleo:

Aplicar en pulverización normal con tractor, excepto en fresal en invernadero que se aplicará de forma manual mediante lanza o pistola. En el caso de aplicaciones en árboles frutales ver detenidamente las condiciones generales de uso.

| USO                                           | AGENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dosis g/hl | Vol. de caldo l/ha |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Albaricoquero<br>Melocotonero                 | Abolladura (lepra del melocotonero, <i>Taphrina deformans</i> )<br>Antracnosis ( <i>Colletotrichum</i> spp.) Chancro del almendro ( <i>Diaporthe amygdali</i> ), Cribado (perdigonado, <i>Wilsonomyces carpophilus</i> ) Moteado del melocotonero ( <i>Venturia carpophila</i> )<br>Monilia ( <i>Monilinia</i> spp.)                     | 150-250    | 750-1500           |
|                                               | Cicatrización heridas de granizo                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250-300    |                    |
| Cerezo                                        | Lepra del cerezo ( <i>Taphrina wiesneri</i> ) Cilindrosporiosis (antracnosis del cerezo, <i>Blumeriella jaapii</i> ) Chancro del almendro ( <i>Diaporthe amygdali</i> ) Cribado (perdigonado, <i>Wilsonomyces carpophilus</i> ) Moteado (cribado del cerezo, <i>Venturia cerasi</i> ) Monilia ( <i>Monilinia</i> spp.)                   | 150-250    | 750-1500           |
|                                               | Cicatrización heridas de granizo                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250-300    |                    |
| Ciruelo                                       | Ciruelas del diablo (lepra del ciruelo, <i>Taphrina pruni</i> )<br>Antracnosis ( <i>Colletotrichum</i> spp.) Chancro del almendro, ( <i>Diaporthe amygdali</i> ) Cribado (perdigonado, <i>Wilsonomyces carpophilus</i> ) Moteado del melocotonero ( <i>Venturia carpophila</i> )<br>Monilia ( <i>Monilinia</i> spp.)                     | 150-250    | 750-1500           |
|                                               | Cicatrización heridas de granizo                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250-300    |                    |
| Endrino<br>(solo en plantaciones comerciales) | Ciruelas del diablo (lepra del ciruelo, <i>Taphrina pruni</i> )<br>Antracnosis ( <i>Colletotrichum</i> spp.) Chancro del almendro, ( <i>Diaporthe amygdali</i> ) Cribado (perdigonado, <i>Wilsonomyces carpophilus</i> ) Moteado del melocotonero ( <i>Venturia carpophila</i> )<br>Monilia ( <i>Monilinia</i> spp.)                     | 150-250    | 750-1500           |
|                                               | Cicatrización heridas de granizo                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250-300    |                    |
| Frutales de pepita                            | Gloeosporiosis (antracnosis de las manzanas, <i>Neofabraea vagabunda</i> ) Chancro europeo ( <i>Neonectria ditissima</i> )<br>Moteado o roña del peral ( <i>Venturia pyrina</i> ) Moteado o roña del manzano ( <i>Venturia inaequalis</i> ) Estemfilosis (mancha negra, <i>Stemphylium vesicarium</i> ) Monilia ( <i>Monilinia</i> spp.) | 150-250    | 750-1500           |
|                                               | Cicatrización heridas de granizo                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250-300    |                    |
| Fresal<br>(aire libre e invernadero)          | <i>Botrytis</i> spp. Antracnosis del fresón ( <i>Colletotrichum acutatum</i> )<br>Podredumbre del tronco, corona y fruto, ( <i>Phytophthora Cactorum</i> )                                                                                                                                                                               | 150-250    | 500-1000           |
| Tomate<br>(aire libre)                        | <i>Botrytis</i> spp. Alternaria de las solanáceas ( <i>Alternaria solani</i> )<br>Antracnosis del tomate ( <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> )<br>Mildiu de la patata y el tomate, ( <i>Phytophthora infestans</i> )                                                                                                                 | 150-250    | 500-1250           |

#### CONDICIONAMIENTOS ESPECÍFICOS:

**Albaricoquero, melocotonero, ciruelo y endrino:** aplicar durante BBCH 69-89, con un máximo de 2 aplicaciones separadas al menos 10 días, sin superar la dosis máxima por aplicación de 2,7 kg/ha.

**Cerezo:** aplicar durante BBCH 69-89, con un máximo de 2 aplicaciones separadas al menos 7 días, sin superar la dosis máxima por aplicación de 2,25 kg/ha.

**Frutales de pepita:** aplicar durante BBCH 69-80, con un máximo de 4 aplicaciones separadas al menos 10 días, sin superar la dosis máxima por aplicación de 2 kg/ha.

**Cicatrización de heridas de granizo:** realizar una única aplicación durante el rango de BBCH ya especificado, sin superar las siguientes dosis máximas: Cerezo: 2,25 kg/ha; albaricoquero, melocotonero, ciruelo y endrino: 3,75 kg/ha; frutales de pepita: 2 kg/ha.

**Fresal:** aplicar durante BBCH 19-89, con un máximo de 2 aplicaciones separadas al menos 7 días, sin superar la dosis máxima por aplicación de 1,8 kg/ha.

**Tomate:** aplicar durante BBCH 21-89, con un máximo de 4 aplicaciones separadas al menos 7 días, sin superar la dosis máxima por aplicación de 2,25 kg/ha.

**CONDICIONES GENERALES DE USO:** Para los usos del producto en el exterior se aplicarán las condiciones siguientes: Sólo podrá utilizarse el producto fuera de la floración de los cultivos y cuando no haya malas hierbas en floración en los surcos de los cultivos tratados. En el caso de las aplicaciones en árboles frutales, se emplearán equipos de aplicación de plaguicidas que aumenten la precisión y exactitud de la aplicación (por ejemplo, escudos de emisión, pulverizadores blindados, pulverizadores de barra con campanas, pulverizadores de túneles o pulverizadores controlados por sensores) y que logren una reducción media de la exposición de al menos el 61 % del producto fitosanitario aplicado (por hectárea), y una reducción mínima de la pérdida de productos fitosanitarios en el suelo del 20 % (manteniendo la tasa de aplicación en las superficies objetivo), en comparación con las aplicaciones a través de equipos y prácticas de aplicación convencionales.

## 9. GESTIÓN DE RESISTENCIAS:

El producto tiene un riesgo bajo de desarrollo de resistencias. No obstante, se recomienda alternar con fungicidas con otros modos de acción. Siempre se ha de tener en cuenta las condiciones meteorológicas para decidir el momento más adecuado para la aplicación. La máxima eficacia del producto se obtiene con aplicaciones preventivas o en fases tempranas del desarrollo de la enfermedad. Se recomiendan como medidas complementarias a la aplicación de fungicidas, el uso de variedades resistentes o tolerantes a enfermedades.

## 10. PLAZO DE SEGURIDAD:

**Fresal:** 14 días.

**Albaricoquero, cerezo, ciruelo, endrino, melocotonero y tomate:** 21 días.

**Frutales de pepita:** 28 días.

Clasificación del modo de acción de las sustancias activas según FRAC:

|       |    |           |
|-------|----|-----------|
| GRUPO | M4 | FUNGICIDA |
|-------|----|-----------|

**Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.**