

FICHA TÉCNICA

1. Producto:

Nombre: **MAG-CAL®**

2. Número de registro:

No procede

3. Contenidos declarados:

**MEZCLA SÓLIDA DE Ca Y Mg (15-5) CON BORO (B) Y MOLIBDENO (Mo)
CORRECTOR DE CARENCIAS DE CALCIO (Ca) y MAGNESIO (Mg) PARA APLICACIÓN
FOLIAR**

Óxido de calcio (CaO) <i>soluble en agua</i>	15 % p/p
Óxido de magnesio (MgO) <i>soluble en agua</i>	5% p/p
Óxido de magnesio (MgO) <i>complejado por ácido lignosulfónico</i>	1 % p/p
Boro (B) <i>soluble en agua</i>	0,9 % p/p
Molibdeno (Mo) <i>soluble en agua</i>	0,3 % p/p
Intervalo de pH que garantiza una estabilidad aceptable de la fracción quelada: 1-9	

4. Formulación:

Gránulos solubles en agua.

5. Características:

MAG-CAL® es corrector de carencias de calcio y magnesio para prevenir o corregir las deficiencias de estos elementos. Además de un aporte de boro, que interviene en la fecundación de la flor, obteniendo un mejor cuajado y un transporte de azúcares hacia los frutos durante la maduración. El molibdeno, cuyo aporte en pequeñas cantidades, está involucrado en la asimilación de los nutrientes por parte de las plantas.

6. Dosis y modo de empleo:

CULTIVO	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
FRUTALES Y CÍTRICOS	200-400 g/hl (2-4 Kg/ha)	Después de caída de pétalos hasta el engorde de los frutos. Cada 15-20 días. En el caso de los cítricos realizar, además, una aplicación en pre-floración.
OLIVO		Aplicar una semana antes de floración y tres semanas después.
UVA D EMESE Y DE VINIFICACIÓN		Realizar 1-3 tratamientos desde floración hasta cosecha.
TOMATE, TOMATE DE INDÚSTRIA Y PIMIENTO		Aplicar a partir de la formación de los ramilletes florales y cuajado del fruto hasta cosecha.
HORTÍCOLAS DE HOJA Y BRÁSSICAS		Realizar 2-4 aplicaciones después del trasplante y previo a épocas de estrés.
CURCUBITÁCEAS		Aplicar después del trasplante o al inicio de la floración.
FRESAS Y OTRAS BERRIES		Aplicar desde el cuajado hasta engorde de frutos.
PATATA		Realizar 2-4 aplicaciones durante la formación y engorde de los tubérculos.
FRUTALES TROPICALES (kiwi, platanera, etc.)		Incrementa número y peso de los frutos, mejora la calidad, firmeza y conservación.

7. Presentación:

Envases de 5 Kg

8. Precaución



PELIGRO

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H361 Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P202 No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

P280 Llevar ropa de protección, equipo de protección para los ojos y la cara.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.

P501 Eliminar el contenido y el recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, de conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional.

Contiene: Calcium diformate y disodium pentaborate dehydrate.

9. Condiciones de almacenamiento:

Conservar el producto en su envase original cerrado en un lugar seco y al abrigo de temperatura extremas.

UTILÍCESE SOLAMENTE EN CASO DE RECONOCIDA NECESIDAD.
NO DEBE SOBREPASARSE LA DOSIS DE APLICACIÓN.

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.