

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

WELGRO® MAR CREMA Ecolicitor®

NÚMERO DE REGISTRO

No procede

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Residuo sólido.....26% p/p (300g/l)
Ácido Algínico.....4,25% p/p (48g/l)
Manitol.....1,25% p/p (14g/l)
K₂O soluble en agua.....1% p/p (11,4g/l)
Densidad.....1,14
Materia orgánica.....19% p/p (216,6g/l)
Materia Inorgánica.....7% p/p (79,5g/l)
Solubilidad.....> 99,5%
Ph.....5
Conductividad eléctrica.....45 ds/m

FORMULACIÓN

Líquido concentrado.

CARACTERÍSTICAS

EXTRACTO DE ALGAS LÍQUIDO

Líquido concentrado de algas del género *ascophyllum nodosum* con un claro efecto estimulante y enraizante de los cultivos

WELGRO® MAR CREMA Ecolicitor® actúa como un estimulante para el cultivo, incrementando las funciones fisiológicas del mismo así como mejorando su respuesta frente a condiciones adversas o procesos patológicos. Entre sus numerosas propiedades, cabe destacar su **POTENTE EFECTO ENRAIZANTE** cuando se aplica en fertirrigación.

PRESENTACIÓN

Envases de 1L (1,14kg) y 5L (5,7kg).

APLICACIONES RECOMENDADAS, MODO DE EMPLEO Y DOSIS

WELGRO® MAR CREMA Ecolicitor® puede ser aplicado en pulverización foliar o en fertirrigación en todos los cultivos incluido el cultivo hidropónico.

FICHA TÉCNICA

CULTIVO	DOSIS	MOMENTO DE APLICACION
Semilleros	30 cc/10l (para 100m ²)	Una vez germinadas las semillas
Tomate, berenjena, pimiento	1,5-2 l/ha	Una aplicación en el trasplante y posteriores cada 15 días.
Platanera	2-2,5 l/ha	Efectuar 3-4 tratamientos desde la salida del invierno.
Patata	2 l/ha	Primera aplicación a los 10 cm de planta. Repetir cada 15 días.
Cucurbitáceas	1,5-2 l/ha	Iniciar con plantas a 3-4 hojas. Repetir cada 15 días.
Otras hortalizas de hoja, brásicas, tubérculos, alcachofa, etc.	1-2 l/ha (100cc/hl)	Primera aplicación a 3 - 4 hojas. Posteriormente cada 15-21 días.
Fresa, frambuesa	1,5 l/ha	Desde que la planta esté enraizada. Continuar cada 15 días.
Frutales de pepita	1,5-2 l/ha (200 cc/hl)	Botón rosa, inicio floración, caída de pétalos.
Frutales de hueso	1,5-2 l/ha (200 cc/hl)	Inicio floración, caída de pétalos, fruto cuajado.
Cítricos	2-2,5 l/ha (150 cc/hl)	Desde brotación 4 tratamientos.
Olivo	2-2,5 l/ha (200 cc/hl)	Brotación, floración y cuajado (3 tratamientos)
Vid y Parral	1,5 l/ha	En los estadios E-F, H y J.
Alfalfa	2,5 l/ha	Después de cada corte.
Céspedes	4 l/ha	A la salida del invierno y después de cada corte.
Aplicaciones en fertirrigación, se recomienda utilizar 3 - 4 l/ha.		

Mezcla: Agitar bien el producto antes de abrirlo. Llenar el tanque de aplicación con la mitad de la cantidad de agua necesaria. Comenzar la agitación del contenedor y añadir lentamente la cantidad necesaria de producto.

Soluciones diluidas del producto deberán ser aplicadas en 24h.

COMPATIBILIDAD

No mezclar con aceites ni con productos muy ácidos y usar dosis bajas en mezcla con azufres, productos a base de calcio y correctores metálicos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en su envase original cerrado en un lugar seco y al abrigo de temperaturas extremas

FICHA TÉCNICA

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente