

FICHA TÉCNICA

1. Producto:

Nombre: **WELGRO® POST**

2. Número de registro:

Abono CE- no procede

3. Contenidos declarados:

ABONO INORGÁNICO SÓLIDO COMPUESTO A BASE DE MACRONUTRIENTES CON MICRONUTRIENTES - CFP1 (C)(I)(a)(ii) ABONO MINERAL PK 12-8 CON MICRONUTRIENTES: BORO (B), COBRE (Cu), MOLIBDENO (Mo) y ZINC (Zn) ABONO PARA APLICACIÓN FOLIAR • HIDROSOLUBLE	
Pentóxido de fósforo (P ₂ O ₅) total, soluble en agua y en citrato amónico neutro	12 % p/p
Óxido de potasio (K ₂ O) soluble en agua	8 % p/p
Boro (B) soluble en agua (sal sódica)	7 % p/p
Cobre (Cu) total (óxido)	10 % p/p
Molibdeno (Mo) soluble en agua (sal amónica)	1 % p/p
Zinc (Zn) total (óxido)	10 % p/p

4. Formulación:

Polvo soluble en agua.

5. Lista de ingredientes:

Octaborato disódico tetrahidratado (nºCAS 12008-41-2) (CMC1: Sustancias y mezclas de materiales vírgenes), Fosfato monopotásico (nºCAS 7778-77-0) (CMC1), Óxido de zinc (nºCAS 1314-13-12) (CMC 1), Óxido de cobre (nº CAS 1317-38-0) (CMC 1), Lignosulfonato sódico (nº CAS 8061-51-6) (CMC 1).

6. Granulometría:

Polvo. El 90 % del producto pasa por un tamiz de 250 micras.

7. Características:

Aunque puede ser aplicado en otros cultivos, **WELGRO® POST** está especialmente diseñado para ser disuelto en agua y aplicado foliarmente en cultivos leñosos después de la cosecha o al inicio de la caída de las hojas, en caso de cultivos de hoja caduca. El contenido de fósforo (P) que contiene la formulación ayuda a aumentar las reservas antes del reposo invernal, mejorando la brotación del año siguiente. Así mismo, el Boro completamente soluble y disponible para el cultivo, ayuda la diferenciación y floración de la siguiente campaña. Todo ello va complementado con molibdeno, que ayuda a la lignificación de los tejidos antes del invierno, haciendo de **WELGRO® POST** un aporte ideal después de la cosecha.

8. Dosis y modo de empleo:

CULTIVO	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
Cultivos leñosos (Almendo, olivo, frutales, pistacho,nogal,vid...etc)	1,5-2,5 Kg/ha	Aplicar después de la cosecha o incluso durante la cosecha (justo después de la recolección mecánica). También puede ser aplicado antes de la caída de hojas o cuando se detecte alguna carencia. Aumenta las reservas antes de la parada invernal para la brotación y diferenciación floral de la campaña siguiente.
Otros cultivos	1,5-2,5 Kg/ha	Aplicar al detectarse los primeros síntomas de carencia. Repetir si es necesario.

9. Presentación:

Envases de 5 Kg

10. Clasificación toxicológica:



H318 Provoca lesiones oculares graves.
H360FD Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P201 Solicitar instrucciones especiales antes del uso.
P202 No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
P280 Llevar ropa de protección, equipo de protección para los ojos y la cara.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P308+P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
P391 Recoger el vertido. P405 Guardar bajo llave. Contiene: óxido de dicobre, octaborato de sodio tetrahidratado.

PELIGRO

11. Condiciones de almacenamiento:

Almacene el producto en un espacio seco y bien ventilado alejado de la luz solar directa. Los envases parcialmente usados deben cerrarse correctamente.

UTILICESE SOLAMENTE EN CASO DE RECONOCIDA NECESIDAD. NO DEBE SOBREPASARSE LA DOSIS DE APLICACIÓN.

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.