

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

SITOFEX®

NÚMERO DE REGISTRO

ES-00812

COMPOSICIÓN

Forclorfenurón 1 % p/v. Contiene etanol (CAS 64-17-5).

FORMULACIÓN

Concentrado emulsionable (EC).

DESCRIPCIÓN

SITOFEX® es un regulador de crecimiento muy activo que aumenta el tamaño de los frutos de kiwi y vid. El ingrediente activo Forclorfenurón (CPPU) actúa a través del incremento del tamaño y el número de las células mostrando una directa influencia en el fruto y no se transloca en los tejidos de las plantas, es suficiente aplicar directamente sobre los frutos.

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA



PELIGRO

H225 Líquido y vapores muy inflamables

H315 Provoca irritación cutánea.

H319 Provoca irritación ocular grave.

H351 Se sospecha que provoca cáncer.

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

P201+P202 Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

P210 Mantener alejado de fuentes de calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol.

P280 Llevar guantes, prendas y mascarilla de protección.

P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P370+P378 En caso de incendio: Utilizar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo químico seco o dióxido de carbono para apagarlo.

P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

FICHA TÉCNICA

PRESENTACIÓN

Envase 250 ml

APLICACIONES AUTORIZADAS, DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicar al aire libre.

Cultivo	Efecto	Dosis l/ha	Nº aplicaciones	Volumen de caldo	Forma y época de aplicación	P.S (días)
Kiwi	Regulador del crecimiento	0,5-1	1	1.000-1.500 l/ha	Aplicar de 3 a 4 semanas después de la plena floración. Pulverización con tractor y manual con lanza o mochila. BBCH 73	NP
Vid	Regular crecimiento	0,5-1	1	1.000 l/ha	Aplicar pulverizando a las hojas. BBCH 73-75	NP
				500 l/ha	Tratar en aerosol dirigido a la fruta. BBCH 73-75	

Aplicar como una fina nube para mojar bien todos los frutos, evitando la formación de goteo. Aplicar preferiblemente por la mañana o al final de la tarde evitando siempre las horas del mediodía. Evitar aplicar si hay riesgo de lluvia. No mezclar SITOEX® con otros productos. Como la eficacia del producto depende de muchas variables como vigor de los árboles, régimen de abonado, cantidad de producción y condiciones meteorológicas, recomendamos realizar pruebas previas antes de aplicar el producto en tratamientos masivos. Después de la aplicación de SITOEX® se necesita ajustar los medios de producción ya que las necesidades de la planta aumentan. Por esta razón, es importante ajustar las aplicaciones de abono y balance de riegos de acuerdo con las necesidades del cultivo. SITOEX® puede alterar levemente la forma de los frutos. Aplicar únicamente en plantaciones con frutos bien polinizados.

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.