

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

SITIS®

NÚMERO DE REGISTRO

ES-01180

COMPOSICIÓN

6-Benziladenina 10% (100 g/l)

FORMULACIÓN

Suspensión concentrada (SC).

DESCRIPCIÓN

Fitorregulador para aclareo de manzanas y peras, favorece el aumento del tamaño de los frutos por incremento de la división celular. También favorece la ramificación en cultivos ornamentales.

PRESENTACIÓN

Envases de 1 L.

APLICACIONES AUTORIZADAS, DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Tratamiento fitorregulador al aire libre por pulverización foliar con tractor para el aclareo y mejora del tamaño del fruto:

CULTIVO	AGENTE	DOSIS (l/ha)	Nº APLICACIONES	INTERVALO (días)	VOLUMEN DE CALDO	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN	P.S (días)
Árboles y arbustos frutales (Viveros)	FITORREGULADOR (Tratamientos para incrementar la ramificación)	0,6	4	7	50 l/ha	No apto para árboles cuya producción vaya destinada al consumo humano. Aplicar en crecimiento activo y longitud del brote apical 7-8 cm	NP
Manzano	Aumentar tamaño fruto	0,75-1,5	1-2	3	300-1000 l/ha	Se realizará 1 única aplicación para la dosis máx. de 1,5 l/ha.	90
	Aclareo frutos					Se realizarán 2 aplicaciones para la dosis máx. de 0,75 l/ha. Aplicar con el fruto entre 7 - 15 mm (durante BBCH 71-72).	
Peral	Aclareo de frutos	1,5	1	-	300-1000 l/ha	Aplicar con el fruto entre 7 - 15 mm (durante BBCH 71-72)	
	Aumentar tamaño de frutos						

FICHA TÉCNICA

RECOMENDACIONES DE USO

Inducción de aclareo:

Adecuar la dosis de **SITIS®** teniendo en cuenta la susceptibilidad de la variedad a los inductores de aclareo químicos, a la producción alterna y a la producción de frutos de pequeño tamaño. Se recomienda realizar el tratamiento cuando los frutos centrales en madera vieja tengan un diámetro de 7-15 mm en estado de plena vegetación. Adaptar el volumen de agua al tamaño de los árboles y a su volumen de vegetación para asegurar una buena cobertura del follaje y los frutos. Pulverizar cuando se prevea que la temperatura diurna en los días posteriores será superior a 15°C. Para una buena eficacia es importante que la temperatura diurna media en los 3-5 días posteriores al tratamiento sea de superior a 15°C. Elevadas temperaturas (por encima de 28°C) durante este periodo pueden provocar un aclareo excesivo. No aplicar **SITIS®** si la temperatura es inferior a 15°C. La aplicación en condiciones de frío, heladas o sequía pueden provocar una respuesta deficiente.

Ramificación de árboles en viveros:

Aplicar en vegetación activa, cuando los brotes apicales tienen una longitud de 7-8 cm. Repetir la aplicación cada 7 días. La pulverización debe dirigirse a la parte apical del brote principal.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA EN TANQUE

Añadir la dosis requerida de **SITIS®** al tanque pulverizador medio lleno de agua y mantenerlo en agitación. Rellenar el tanque y continuar agitando durante la pulverización. Utilizar la solución dentro del plazo de las 24 horas posteriores a la preparación del caldo.

LIMPIEZA DEL TANQUE TRAS LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Enjuagar el tanque con agua limpia y pulverizar la parcela tratada.

PRECAUCIONES

No realizar tratamientos inductores del aclareo si han transcurrido más de 30 días tras la plena floración.

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.