

## FICHA TÉCNICA

### 1. Producto:

Nombre: **ARCADE®**

### 2. Número de registro:

**24.880**

Denominación común:

**CORE**

### 3. Composición:

DIFENOCONAZOL 25% p/v (250 g/l)

Contiene nafta disolvente del petróleo (Nº CAS 64742-94-5) y mezcla de nafta fracción aromática ligera (Nº CAS 64742-95-6) con 1-butano (Nº CAS 71-36-3) y sulfonato orgánico.

### 4. Formulación:

Concentrado emulsionable (EC).

### 5. Descripción:

**ARCADE®** es una formulación fungicida de contacto y sistémica, con actividad preventiva, curativa y erradicante. Es absorbido rápidamente por las partes verdes de la planta y, por tanto, no se lava con la lluvia. Su amplio campo de actividad hace que sea adecuado para el control de enfermedades producidas por complejos fúngicos.

### 6. Clasificación toxicológica:



H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H319 Provoca irritación ocular grave.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

H351 Se sospecha que provoca cáncer.

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

**PELIGRO**

P201+P202 Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.  
 P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.  
 P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.  
 P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.  
 P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.  
 P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que facilite la respiración.  
 P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.  
 P273 Evitar su liberación al medio ambiente.  
 P391 Recoger el vertido.  
 P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.  
 UFI: EFV4-Q0U8-500E-PCCY

**7. Presentación:**

Envases de 1L y 5L

**8. Aplicaciones autorizadas, dosis y modo de empleo:**

Aplicar en pulverización normal en los siguientes cultivos:

Cultivos	Enfermedades	Dosis	Condicionamientos específicos	P.S.
Ajo	Alternaria, Roya	0,3-0,5 l/ha	Efectuar hasta 3 aplicaciones por campaña a intervalos de 14 días y un volumen de caldo de 800-1000 l/ha. El plazo de re-entrada tras la 3ª aplicación será de 5 días.	30 días
Apio	Septoria	0,3-0,5 l/ha	Efectuar hasta 3 aplicaciones por campaña a intervalos de 10-14 días y un volumen de caldo de 800-1000 l/ha. El plazo de re-entrada tras la 3ª aplicación será de 5 días.	14 días
Clavel	Roya	0,3-0,5 l/ha	Aire libre e invernadero. Efectuar una sola aplicación por campaña, con un volumen de caldo de 500-1000 l/ha al aire libre y 75-250 l/ha en invernadero.	NP

Cultivos	Enfermedades	Dosis	Condicionamientos específicos	P.S.
Espárrago	Alternaria, Roya	0,3-0,5 l/ha	Efectuar hasta 4 aplicaciones por campaña con un intervalo de 14 días y un volumen de caldo de 600-1.000 l/ha. El plazo de reentrada es de 5 días tras la 3ª aplicación y de 14 días tras la 4ª.	180 días
Lechuga	Alternaria	0,5-0,8 l/ha	Efectuar hasta 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 14 días y un volumen de caldo de 1.000-1.600 l/ha. El plazo de reentrada tras la 2ª aplicación será de 11 días.	14 días
Manzano, níspero, níspero del Japón.	Moteado	0,01-0,02 %	Efectuar hasta 4 aplicaciones por campaña a intervalos de 14 días y un volumen de caldo de 1000-1500 l/ha sin sobrepasar la dosis de 0,3 l/ha y aplicación. Se respetará un plazo de re-entrada de 3 días tras la 3ª aplicación y de 9 días tras la 4ª.	14 días
Olivo	Repilo	0,6 l/ha	Efectuar una sola aplicación por campaña, con un volumen de caldo de 1.000 l/ha. Tratar preferentemente en primavera	30 días
Patata	Alternaria	0,5-0,8 l/ha	Efectuar hasta 2 aplicaciones por campaña a intervalos de 14 días y un volumen de caldo de 800-1.000 l/ha. y aplicación. Se respetará un plazo de reentrada de 11 días tras la 2ª aplicación.	30 días
Peral	Moteado, Roya, Septoria	0,01-0,02 %	Efectuar hasta 4 aplicaciones por campaña a intervalos de 14 días y un volumen de caldo de 1000-1500 l/ha sin sobrepasar la dosis de 0,3 l/ha y aplicación. Se respetará un plazo de re-entrada de 3 días tras la 3ª aplicación y de 9 días tras la 4ª.	14 días
Remolacha azucarera	Cercospora, Oidio	0,3-0,5 l/ha	Efectuar hasta 2 aplicaciones por campaña con un intervalo de 21-28 días y un volumen de caldo de 600-1.000 l/ha.	30 días
Tomate	Alternaria	0,3-0,5 l/ha	Aire libre e invernadero. Efectuar hasta 3 aplicaciones por campaña, a intervalos de 14 días, con un volumen de caldo de 1.000-1.600 l/ha. al aire libre y 125-200 l/ha. en invernadero.	3 días

## 9. Observaciones:

El preparado no se usará en combinación con otros productos. En caso de ser necesario un mayor número de aplicaciones, éstas deberán realizarse con productos de distinta familia química.

**Clasificación del modo de acción de las sustancias activas según FRAC:**

GRUPO	3	FUNGICIDA
-------	---	-----------

**Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.**