

FICHA TÉCNICA

1. Producto:

Nombre: **CUMILZAN®**

2. Número de registro:

ES-01717

Denominación común:

MAXENTIS

3. Composición:

AZOXISTROBIN 20% p/v (177 g/kg), PROTIOCONAZOL 15% p/v (133 g/kg)
Contiene: 1,2-Benzisotiazol-3-(2H)-ona (CAS 2634-33-5)

4. Formulación:

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC).

5. Descripción:

CUMILZAN® es un fungicida de amplio espectro con acción preventiva y curativa sobre diversas enfermedades de los cereales.

6. Clasificación toxicológica:



H302+H332 Nocivo en caso de ingestión o inhalación.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. **P280** Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.

P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

P391 Recoger el vertido.

P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

7. Presentación:

Envases de 1L y 5L

8. Aplicaciones autorizadas, dosis y modo de empleo:

Aplicar el producto al aire libre mediante pulverización foliar con tractor equipado con barra pulverizadora.

Cultivo	ENFERMEDAD	Dosis (L/ha)	Condicionamientos específicos	P.S
Trigo	Helminthosporiosis del trigo (<i>Pyrenophora tritici repens</i>) Oídio de los cereales (<i>Blumeria graminis</i>) Septorios (<i>Septoria</i> spp.) Roya (<i>Puccinia</i> spp.)	0,8 - 1	Indicado para trigo de invierno. Eficacia demostrada frente a <i>Septoria tritici</i> , <i>Puccinia recondita</i> y <i>Puccinia striiformis</i> . Realizar una única aplicación, entre el estado de BBCH 30 (comienzo del encañado) y el BBCH 59 (final de la floración), utilizando un volumen de caldo de 100-400 L/ha.	NP
	Fusariosis (<i>Fusarium</i> spp.) <i>Microdochium</i> spp.	0,8 - 1	Indicado para trigo de invierno. Realizar una única aplicación, entre el estado de BBCH 31 (primer nudo por lo menos 1 cm por encima del nudo del macollaje) y el BBCH 69 (final de la floración), utilizando un volumen de caldo de 100-400 L/ha.	NP
Cebada	Helminthosporiosis reticular de la cebada (<i>Pyrenophora teres</i>) Oídio de los cereales (<i>Blumeria graminis</i>) Rincosporiosis, escaldado de cereales (<i>Rhynchosporium secalis</i>) Roya (<i>Puccinia</i> spp.)	0,8 - 1	Realizar una única aplicación, entre el estado de BBCH 30 (comienzo del encañado) y el BBCH 59 (final de la floración), utilizando un volumen de caldo de 100-400 L/ha.	NP
Centeno	Rincosporiosis, escaldado de cereales (<i>Rhynchosporium secalis</i>) Roya (<i>Puccinia</i> spp.) Septorios (<i>Septoria</i> spp.)	0,8 - 1	Eficaz frente a <i>Puccinia recondita</i> , <i>Septoria tritici</i> y <i>Septoria nodorum</i> . Realizar una única aplicación, entre el estado de BBCH 30 (comienzo del encañado) y el BBCH 59 (final de la floración), utilizando un volumen de caldo de 100-400 L/ha.	NP
Triticale	Oídio de los cereales (<i>Blumeria graminis</i>) Roya (<i>Puccinia</i> spp.) Septorios (<i>Septoria</i> spp.)	0,8 - 1	Eficaz frente a <i>Puccinia recondita</i> y <i>Septoria tritici</i> . Aplicar durante BBCH 30-59. Realizar una única aplicación, entre el estado de BBCH 30 (comienzo del encañado) y el BBCH 59 (final de la floración), utilizando un volumen de caldo de 100-400 L/ha.	NP

*PS: Plazo de seguridad, NP: No procede

9. Observaciones:

El producto tiene un riesgo bajo-medio de desarrollo de resistencias, por combinar dos materias activas con distinto modo de acción. No obstante, se recomienda alternar con fungicidas con otros modos de acción. Siempre se ha de tener en cuenta las condiciones meteorológicas para decidir el momento más adecuado para la aplicación. La máxima eficacia del producto se obtiene con aplicaciones preventivas o en fases tempranas del desarrollo de la enfermedad. Se recomiendan como medidas complementarias a la aplicación de fungicidas, el uso de variedades resistentes o tolerantes a enfermedades y la rotación de cultivos.

Clasificación del modo de acción de las sustancias activas según HRAC:

GRUPO	11 3	FUNGICIDA
--------------	-------------	------------------

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.