

FICHA TÉCNICA

1. Producto:

Nombre: **SUMICIDIN®EXTRA 5 EW**

2. Número de registro:

ES-00355

3. Composición:

Esfenvalerato 5% p/v (50 g/l)

4. Formulación:

Emulsión de aceite en agua (EW)

5. Descripción:

SUMICIDIN® Extra 5 EW es un insecticida piretroide de nueva generación, que posee un amplio espectro de acción y que, a dosis muy bajas de materia activa, permite controlar numerosas plagas en varios cultivos.

6. Clasificación toxicológica:



ATENCIÓN

H302 Nocivo en caso de ingestión.
H371 Puede provocar daños en los órganos (sistema nervioso).
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P391 Recoger el vertido.
P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.
EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
EUH208 Contiene esfenvalerato y 1,2-benzisothiazolin-3-one. Puede provocar una reacción alérgica.
El preparado no se usará en combinación con otros productos.

7. Presentación:

Envase 1 L y 5 L

8. Aplicaciones autorizadas, modo de empleo y dosis

Aplicar al aire libre en pulverización normal con tractor. Es conveniente mojar bien el cultivo.

CULTIVO	AGENTE	DOSIS l/ha	P.S (días)
Algodonero	Lepidópteros / Áfidos, pulgones (<i>Aphididae</i>)	0,2-0,3	30
Tomate	Noctuidos (<i>Noctuidae</i>) / Áfidos, pulgones (<i>Aphididae</i>)		3
Arbustos y pequeños árboles ornamentales, Ornamentales herbáceas, Palmáceas, Coníferas (exclusivamente usos ornamentales), Frondosas (exclusivamente usos ornamentales) y Palmera datilera (exclusivamente para uso ornamental, no apto para consumo humano)	Heliothis (<i>Helicoverpa spp.</i>) / Áfidos, pulgones (<i>Aphididae</i>)		NP
Avena	Áfidos, pulgones (<i>Aphididae</i>)		28
Cebada, Centeno, Trigo y Triticale	Sanpedrito, paulillón (<i>Eurygaster austriaca</i>) / Lema, babosilla (<i>Oulema melanopus</i>) / Nefasia, (<i>Cnephasia pumicana</i>) / Áfidos, pulgones (<i>Aphididae</i>)		28
Colza	Lepidópteros		42
Vid	Polilla del racimo, (<i>Lobesia Botrana</i>) / Polilla de la vid (<i>Eupoecilia Ambiguella</i>)		15

CULTIVO	AGENTE	DOSIS l/ha	P.S (días)
Remolacha azucarera	Pulguilla de la remolacha, (<i>Chaetocnema tibialis</i>) / Noctuidos (<i>Noctuidae</i>) / Áfidos, pulgones (<i>Aphididae</i>)		30
Patata	Míridos (<i>Miridae</i>) / Noctuidos, (<i>Noctuidae</i>) / Áfidos, pulgones / (<i>Aphididae</i>) / Escarabajo de la patata (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	0,2-0,3	15
Frutales de pepita	Carpocapsa de manzanas y peras (<i>Cydia pomonella</i>) / Áfidos, pulgones (<i>Aphididae</i>) / Psila del peral (<i>Cacopsylla pyri</i>)	0,198	14
Melocotonero, Albaricoquero	Áfidos, pulgones (<i>Aphididae</i>)		3
Alfalfa	Gusano verde de la alfalfa (<i>Hypera postica</i>)	0,18	NP

9. CONDICIONAMIENTO ESPECÍFICO:

Albaricoquero y Melocotonero: Realizar 1-3 aplicaciones con un intervalo de 14 días, volumen de caldo 1000 L/ha. Aplicar entre BBCH 11-85.

Alfalfa: Realizar 3 aplicaciones con un intervalo de 14 días, volumen de caldo 300-600 L/ha. Aplicar de BBCH 31 en adelante.

Algodonero: realizar 1-3 aplicaciones con un intervalo de 14 días, volumen de caldo 400-600 L/ha. Aplicar entre BBCH 11-40 y entre BBCH 49-79. En Lepidópteros, contra orugas (larvas de lepidópteros).

Avena: realizar 1-2 aplicaciones con un intervalo de 14 días, volumen de caldo 150-200 L/ha. Aplicar entre BBCH 12-75.

Cebada, Centeno, Trigo y Triticale: realizar 1-2 aplicaciones con un intervalo de 14 días, volumen de caldo 150-200 L/ha. Aplicar entre BBCH 12-75.

Colza: realizar 1-2 aplicaciones con un intervalo de 14 días, volumen de caldo 200-400 L/ha. Aplicar entre BBCH 12-59 y entre BBCH 70-79. Eficaz contra polillas (orugas de lepidópteros).

Frutales de pepita: realizar 1-3 aplicaciones con un intervalo de 14 días, volumen de caldo 1000 L/ha. Aplicar entre BBCH 11-85. En Manzano y Peral.

Patata: realizar 1-3 aplicaciones con un intervalo de 14 días, volumen de caldo 400-500 L/ha. Aplicar de BBCH 12 en adelante. Para Míridos, eficaz exclusivamente contra *Lygocoris pabulinus* y *Liocoris tripustulatus*. Para Noctuidos, eficaz exclusivamente contra *Autographa gamma*, *Spodoptera littoralis* y *Helicoverpa armigera*.

Remolacha azucarera: realizar 1-2 aplicaciones con un intervalo de 14 días, volumen de caldo 200-400 L/ha. Aplicar entre BBCH 11-49. Para Noctuidos, eficaz exclusivamente contra *Autographa gamma*, *Chrysodeixis chalcites*, *Helicoverpa armigera* y *Mamestra brassicae*.

Tomate: realizar 1-3 aplicaciones con un intervalo de 14 días, volumen de caldo 500-1200 L/ha. Aplicar entre BBCH 11-40 y entre BBCH 49-85. Para Noctuidos, eficaz exclusivamente contra larvas de noctuidos.

Vid: realizar 1-2 aplicaciones con un intervalo de 14 días, volumen de caldo 600-1500 L/ha. Aplicar entre BBCH 11-85.

Ornamentales herbáceas, Arbustos y pequeños árboles ornamentales, Palmáceas, Coníferas, Frondosas, Palmera datilera: realizar 1-3 aplicaciones con un intervalo de 14 días, volumen de caldo 1000-1500 L/ha. Aplicar cuando aparezca la plaga. No aplicar entre BBCH 40-49. Para *Heliothis*, eficaz exclusivamente contra *Helicoverpa armigera*.

Clasificación del modo de acción de las sustancias activas según IRAC:

GRUPO	3A	INSECTICIDA
--------------	-----------	--------------------

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.