

FICHA TÉCNICA

1. Producto:

Nombre: **SIMILSSO®**

2. Número de registro:

ES-01813

Denominación común

MILSAJ

3. Composición:

Spinosad 48% p/v (480g/L)
Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona

4. Formulación:

Suspensión Concentrada (SC)

5. Descripción:

SIMILSSO® es un insecticida formulado como suspensión concentrada (SC). Es un producto para el control de insectos, cuya sustancia activa, Spinosad, se obtiene de forma natural por fermentación de la bacteria del suelo *Saccharopolyspora spinosa*. Actúa por ingestión, contacto y tiene acción translaminar.

6. Clasificación toxicológica:



ATENCIÓN

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

P261 Evitar respirar la niebla y los aerosoles.

P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P391 Recoger el vertido.

P501 Elimínense el contenido y/o recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

EUH208 Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (CAS 2634-33-5). Puede provocar una reacción alérgica.

EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

7. Presentación:

Envase de 250 mL y 1L

8. Aplicaciones autorizadas, dosis y modo de empleo:

Tratamiento insecticida al aire libre por pulverización con tractor y manual (lanza/pistola o mochila), e invernadero por pulverización manual (lanza/pistola o mochila) y pulverización con carretilla. Agregue la cantidad recomendada de producto al tanque de pulverización al inicio del llenado con agua y complete el volumen de agua requerido teniendo en cuenta el área del cultivo a tratar. Mantenga el tanque agitado continuamente durante la preparación de la mezcla y la aplicación del tratamiento. No prepare más solución de pulverización de la que se necesita. Agitar enérgicamente antes de usar.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (l/ha)	Caldo (l/ha)	APLICACIÓN	P.S. (Días)
Berenjena (aire libre e invernadero)	Heliothis (<i>Helicoverpa</i> spp.) Rosquilla negra (<i>Spodoptera littoralis</i>) Polilla del tomate (<i>Tuta absoluta</i>) Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	0,158-0,2	500-1000	Una sola aplicación durante BBCH 14-89	3
Tomate (aire libre e invernadero)					
Pimiento (aire libre e invernadero)					
Berro de agua (aire libre)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>) Lepidópteros	0,158-0,2	400-800	Una sola aplicación durante BBCH 10-49	3
Berro, masturezo (aire libre)					
Lechuga (aire libre)					
Perifolio (aire libre e invernadero)					
Frutales de pepita (aire libre)	Carpocapsa de manzanas y peras (<i>Cydia pomonella</i>)	0,158-0,2	800-1000	Una sola aplicación durante BBCH 71-89	7
Melocotonero y nectarino (aire libre)	Polilla oriental (<i>Grapholita molesta</i>),	0,158-0,2	800-1000	Una sola aplicación durante BBCH 31-89	7
Vid (aire libre)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>) y Polilla del racimo (<i>Lobesia botrana</i>)	0,125-0,2	200-1000	Para trips aplicar durante BBCH 11-89 Para polilla del racimo durante BBCH 53-89	14

USOS MENORES AUTORIZADOS:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (l/ha)	Caldo (l/ha)	APLICACIÓN	P.S. (Días)
Albaricoque (aire libre)	Polilla oriental (<i>Grapholita molesta</i>)	0,158-0,2	800-1000	una sola aplicación durante BBCH 31-89	7

Clasificación del modo de acción de las sustancias activas según HRAC:

GRUPO	5	INSECTICIDA
--------------	----------	--------------------

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.