

FICHA TÉCNICA

1. Producto:

Nombre: **MÉRITO MASSÓ®**

2. Número de registro:

ES-01145

Denominación común

COCTEL GOLD

3. Composición:

GLIFOSATO (sal isopropilamina) 18% p/v (180 g/l)
MCPA (sal isopropilamina) 18% p/v (180 g/l)

4. Formulación:

Concentrado soluble (SL)

5. Descripción:

MÉRITO® es un herbicida post-emergencia autorizado para tratamientos herbicidas contra malas hierbas de hoja ancha y gramíneas anuales,

6. Clasificación toxicológica:



ATENCIÓN

H319 Provoca irritación ocular grave.

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol.

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P391 Recoger el vertido.

P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

7. Presentación:

Envase de 5 y 20L

8. Aplicaciones autorizadas, dosis y modo de empleo:

Tratamiento herbicida en post-emergencia por pulverización mecánica y por pulverización manual (*spot application*) para eliminación de varetas en olivo. Aplicación en bandas como máximo a 1/3 de la superficie y aplicación dirigida a la base del tronco contra varetas de olivo.

Para lograr una acción residual más prolongada, evitar arar un mes antes de la aplicación y dos semanas después. Usar material de aplicación o prácticas agrícolas que eviten el contacto de las partes comestibles con el principio activo o con el suelo tratado con el principio activo.

Cultivo	Agente	Dosis (l/ha)	Nº aplicaciones	Intervalos (días)	Caldo (l/ha)	Condicionamiento	P.S. (días)
Aguacate*, caqui*	Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha. Gramíneas anuales	4	1-2	90	300-500	Aplicar contra malas hierbas en sus primeras etapas en fase de desarrollo activo.	15
Cítricos	Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha. Gramíneas anuales	4	1-2	90	300-500	Aplicar contra malas hierbas en sus primeras etapas en fase de desarrollo activo.	NP
Frutales de cáscara*	Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha. Gramíneas anuales	4	1-2	90	300-500	Aplicar hasta el final de la floración: cuajado del fruto visible (hasta BBCH 69) contra malas hierbas en sus primeras etapas en fase de desarrollo activo.	NP
Frutales de hueso	Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha. Gramíneas anuales	4	1-2	90	300-500	Aplicar contra malas hierbas en sus primeras etapas en fase de desarrollo activo.	NP
Frutales de pepita	Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha. Gramíneas anuales	4	1-2	90	300-500	Aplicar contra malas hierbas en sus primeras etapas en fase de desarrollo activo.	NP
Olivo (desección de varetas)	Desección de varetas	3	1	-	200 - 400	Aplicar en primavera o en otoño en árboles mayores de 3-4 años. Solo tratamiento parcial del área donde se produzcan chupones de tronco.	60

Cultivo	Agente	Dosis (l/ha)	Nº aplicaciones	Intervalos (días)	Caldo (l/ha)	Condicionamiento	P.S. (días)
Olivo	Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha. Gramíneas anuales	4	1-2	90	300 - 500	Aplicar contra malas hierbas en sus primeras etapas en fase de desarrollo activo.	60

* Cultivos menores autorizados.

9. Gestión de resistencias:

Deberán seguirse las siguientes recomendaciones: Adoptar prácticas alternativas de control de malas hierbas (mecánicas, culturales, etc.) cuando sea posible, y alternancia de herbicidas (de un modo de acción diferente) para evitar el desarrollo de resistencias.

10. Precauciones:

- Evitar mojar las partes verdes de los cultivos para evitar fitotoxicidad.
- No tratar si amenaza lluvia en el momento de la aplicación ya que la lluvia o riego a las pocas horas del tratamiento puede reducir la eficacia de este al lavar hacia el suelo.
- Tratar en días sin viento, dirigiendo la pulverización de forma que no llegue a las hojas de los cultivos, heridas recientes de poda (menos de dos semanas) o partes no lignificadas (troncos menores de 4 años).
- Evitar el goteo ya que el producto pierde eficacia en contacto con el suelo.
- La mezcla de MÉRITO MASSÓ con otros productos puede disminuir la eficacia del producto.
- Enjuagar bien el equipo de pulverización después de cada aplicación.
- No aplicar, mezclar o almacenar en depósitos o tanques galvanizados de acero sin revestimiento.

Clasificación del modo de acción de las sustancias activas según HRAC:

GRUPO	G	O	HERBICIDA
-------	---	---	-----------

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.