

FICHA TÉCNICA

1. Producto:

Nombre: **STYGMA®EW**

2. Número de registro:

ES-00353

Denominación común

LAOTTA EW

3. Composición:

Abamectina: 1,8% p/v (18 g/l).

Contiene mezcla de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) (CAS 55965-84-9).

4. Formulación:

Emulsión en agua (EW)

5. Descripción:

STYGMA®EW es un insecticida-acaricida formulado como emulsión en agua con acción translaminar y sistemica localizada, de amplio espectro con acción por contacto e ingestión.

6. Clasificación toxicológica:



ATENCIÓN

H302 Nocivo en caso de ingestión. H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H373 Puede provocar daños en el tiroides y sistema nervioso tras exposiciones prolongadas o repetidas.

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol. P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P280 Llevar guantes / prendas/ gafas/ máscara de protección.

P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. P391 Recoger el vertido.

P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

El preparado no se utilizará en combinación con otros productos.

7. Presentación:

Envase de 1L , 5 L

8. Aplicaciones autorizadas, dosis y modo de empleo:

Aplicar en pulverización foliar en los siguientes cultivos y usos autorizados:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (l/ha)	Caldo (l/ha)	APLICACIÓN	P.S. (Días)
Berenjena	Araña roja común (<i>Tetranychus</i> spp.)	0,15 – 1 l/ha	300 – 1000 l/ha	1–3 aplicaciones, intervalo mínimo 7 días, de marzo a octubre en invernadero. Aplicar al comienzo de la infestación.	3
Cucurbitáceas de piel no comestible	Araña roja común (<i>Tetranychus</i> spp.)	0,15 – 1 l/ha	300 – 1000 l/ha	1–2 aplicaciones, intervalo mínimo 7 días, de marzo a octubre en invernadero.	3
Fresal	Araña roja común (<i>Tetranychus</i> spp.)	0,15 – 0,9 l/ha	300 – 1000 l/ha	1–2 aplicaciones, intervalo mínimo 7 días, de marzo a octubre en invernadero. Aplicar al inicio de la infestación 2 aplicaciones de 0,5 l/ha o bien una aplicación de 0,9 l/ha.	3
Tomate	Araña roja común (<i>Tetranychus</i> spp.) Polilla del tomate (<i>Tuta absoluta</i>)	0,15 – 1 l/ha	300 – 1000 l/ha	1–3 aplicaciones, intervalo mínimo 7 días, de marzo a octubre en invernaderos permanentes. Aplicar al comienzo de la infestación.	3

9. Precauciones:

Alternar con acaricidas de distinto modo de acción para evitar la aparición de resistencias.

Clasificación del modo de acción de las sustancias activas según HRAC:

GRUPO	6	INSECTICIDA
--------------	----------	--------------------

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.