

FICHA TÉCNICA

1. Producto:

Nombre: SEVENGIB®

2. Número de registro:

ES-01906

3. Composición:

GIBERELINAS GA7 Y GA4 1% P/V

4. Formulación:

LÍQUIDO SOLUBLE (SL)

5. Descripción:

SEVENGIB® contiene giberelinas GA7 y GA4, hormonas vegetales obtenidas por fermentación, que intervienen en el crecimiento vegetal y que se encuentran de forma natural en las plantas. En melocotoneros, nectarinos, paraguayos y otras variedades e híbridos, **SEVENGIB®** influye en la floración del año siguiente y, al hacerlo, contribuye a regular la carga de los frutos y a mejorar su tamaño en el año siguiente al tratamiento. **SEVENGIB®** se aplica en la fase de inducción floral que depende de cada variedad. Otros parámetros, como podrían ser la distribución de la luz en la copa (cosa que puede verse afectada por el vigor del árbol, el sistema de formación, el tipo de poda, etc..) influyen en el inicio de la fase de inducción floral, así como en la distribución de los botones florales.

6. Clasificación toxicológica:

P261: Evitar respirar la niebla/los vapores.

P262: Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

7. Presentación:

Envases de 5L

8. Aplicaciones autorizadas, dosis y modo de empleo:

SEVENGIB® se aplica desde unos 60 días después de la plena floración y hasta 75-90 días después de plena floración. En el mismo año de la aplicación, la firmeza del fruto puede aumentar.

Modo de mezcla: Añadir la cantidad necesaria de **SEVENGIB®** al depósito del pulverizador medio lleno mientras se agita. Llenar el depósito y seguir agitando mientras se pulveriza. Una vez aplicado el producto, aclarar el depósito con agua limpia y pulverizar sobre la parcela tratada.

USO	DOSIS	P.S
MELOCOTONERO, NECTARINO, PARAGUAYO y otras variedades e híbridos	Se aplica a razón de 7,5 l/ha en pulverización normal con tractor, pulverización manual con lanza o pistola o pulverización manual con mochila. - 2 aplicaciones cada 15 días a 0,5 l/100 l con un volumen de pulverización de 500-1500 l/ha en todo el árbol durante el estadio BBCH 72-77 (normalmente a los 60 días después de la plena floración y a los 75-90 días después de la plena floración). 1) Una primera aplicación a 0,5 l/100 l con un volumen de pulverización de 500-1500 l/ha en todo el árbol aproximadamente 60 días después de la plena floración. 2) una segunda aplicación a 1 l/100 l con un volumen de pulverización de 250-750 l/ha dirigida a la parte superior de los árboles, 15 días después.	NP

9. Compatibilidades:

No mezclar **SEVENGIB®** con otros reguladores del crecimiento vegetal, pesticidas o fertilizantes. Contacte con su asesor técnico para cualquier duda.

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.