

FICHA TÉCNICA

1. Producto:

Nombre: **SITOFEX® 7.5 EC**

2. Número de registro:

ES-01686

3. Composición:

FORCLORFENURÓN 0, 75 % p/v

4. Formulación:

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

5. Descripción:

SITOFEX® 7.5 EC es un regulador de crecimiento muy activo que aumenta el tamaño de los frutos de kiwi y vid. El ingrediente activo Forclorfenurón (CPPU) actúa a través del incremento del tamaño y el número de las células mostrando una directa influencia en el fruto y no se transloca en los tejidos de las plantas, es suficiente aplicar directamente sobre los frutos.

6. Clasificación toxicológica:



H225 Líquido y vapores muy inflamables. H315 Provoca irritación cutánea. H319 Provoca irritación ocular grave. H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. P210 Mantener alejado de fuentes de calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P370+P378 En caso de incendio: Utilizar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo extintor o dióxido de carbono para la extinción. P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

7. Presentación:

Envases de 250 ml

8. Aplicaciones autorizadas, dosis y modo de empleo:

Aplicar al aire libre

Cultivo	Efecto	Dosis l/ha	Nº aplicaciones	Volumen de caldo	Forma y época de aplicación	P.S (días)
Kiwi	Regulador del crecimiento	0,5-1	1	1.000-1.500 l/ha	Aplicar de 3 a 4 semanas después de la plena floración. Pulverización con tractor y manual con lanza o mochila. BBCH 73. No aplique el producto antes de las tres semanas después de la floración porque se pueden desarrollar algunas deformaciones en el ápice de los frutos	NP
Kiwi	Regulador del crecimiento	0,5-1	1	400-600 l/ha	Aplicar de 3 a 4 semanas después de la plena floración. Pulverización con tractor y manual con lanza o mochila. BBCH 73. No aplique el producto antes de las tres semanas después de la floración porque se pueden desarrollar algunas deformaciones en el ápice de los frutos	NP
Vid	Regular crecimiento	1-1,3	1	750-1.000 l/ha	Aplicar en pulverización normal con tractor. BBCH 73-75	NP

Generales: Aplicar como una fina nube para mojar bien todos los frutos, evitando la formación de goteo. Aplicar preferiblemente por la mañana o al final de la tarde evitando siempre las horas del mediodía. Evitar aplicar si hay riesgo de lluvia. No mezclar SITOEX® 7.5 EC con otros productos.

Como la eficacia del producto depende de muchas variables como vigor de los árboles, régimen de abonado, cantidad de producción y condiciones meteorológicas, recomendamos realizar pruebas previas antes de aplicar el producto en tratamientos masivos. Después de la aplicación de SITOEX® 7.5 EC se necesita ajustar los medios de producción ya que las necesidades de la planta aumentan. Por esta razón, es

importante ajustar las aplicaciones de abono y balance de riegos de acuerdo con las necesidades del cultivo. SITOEX® 7.5 EC puede alterar levemente la forma de los frutos. Aplicar únicamente en plantaciones con frutos bien polinizados.

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.