

FICHA TÉCNICA

1. Producto:

Nombre: **WELGRO® ON**

2. Número de registro:

No procede – ABONO CE

3. Contenidos declarados:

CFP 1 (C)(I)(b)(i) ABONO INORGÁNICO LÍQUIDO SIMPLE A BASE DE MACRONUTRIENTES EN SOLUCIÓN.	
Nitrógeno (N) total	28,0% p/p
Nitrógeno (N) ureico	11,5% p/p
Nitrógeno (N) de urea formaldehído	16,5% p/p

4. Formulación:

Líquido.

5. Características:

WELGRO® ON es un rico en nitrógeno. Su solución de abono nitrogenado con urea formaldehído, lo hace un fertilizante nitrogenado especialmente creado para que tenga un aporte doble de nitrógeno:

- 1) La forma ureica ayuda a satisfacer las necesidades inmediatas de la planta. Hace un efecto *Starter*
- 2) La forma ureica formaldehído, asegura una disponibilidad continua y creciente de una fuente de nitrógeno, que posteriormente, estará a disposición del cultivo de forma progresiva.

6. Dosis y modo de empleo:

Aplicar en pulverización foliar o riego por goteo siguiendo las recomendaciones que se exponen a continuación.

CULTIVOS	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
ALGODÓN	5	Aplicar entre floración y formación de cápsulas.
ARROZ	10-15	Aplicar en hoja bandera, puede ser mezclado con los herbicidas.
AJO, CEBOLLA, PUERRO	5	Aplicar a partir de las 3-4 hojas verdaderas.
PATATA	10-20	Aplicar en la tuberización y repetir el intervalo de 2 semanas hasta el desarrollo completo del tubérculo.
CEREALES	10-15	Aplicar en pleno ahijado y en hoja bandera
CÍTRICOS	5-10	Aplicar al inicio del ciclo vegetativo, antes de _oración (mejora la inducciónfloral)
BERRIES	5-10	Aplicar en brotación
FRUTALES	5-10	Aplicar al inicio de floración
	2,5-5	Aplicar durante el crecimiento de los frutos
OLIVO	5-10	Aplicar antes de floración, repetir a los 15 días
HORTÍCOLAS	5-10	Desde el inicio de la floración y repita cada 10-14 días según sea necesario.
HORTÍCOLAS DE HOJA Y BRASICAS	5-10	Desde el inicio de la formación del cogollo y repetir a intervalos de 10-14 días según sea necesario.
MAÍZ	10-15	Aplicar en post emergencia, puede ser mezclado con los herbicidas de post-emergencia.
ORNAMENTALES Y SEMILLEROS	5-10	Aplicar en brotación, se puede repetir cada 20-30 días.
VIÑA Y UVA DE MESA	5-10	Aplicar después del cuajado y 1-2 aplicaciones durante el desarrollo del fruto hasta la envero.
SOJA	5-10	Entre estadio R2 (plena floración) y R3 (inicio de formación de las vainas).
VIVEROS DE FRUTALES	2,5-5	Durante el periodo de crecimiento, se puede repetir cada 20-30 días.
APLICACIÓN POR RIEGO POR GOTEO		
HORTÍCOLAS	30-60	Comenzando en el estadio de la 3. ^a a 4. ^a hoja; repetir cada 2-3 semanas.
CULTIVOS LEÑOSOS	30-60	Aplicar cada 2-3 semanas según sea necesario.

7. Presentación:

Envases de 5 y 10 L

8. Precauciones:

- P102** Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103** Leer la etiqueta antes del uso.
- P262** Evitar el contacto con los ojos y la piel.
- P270** No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P280** Llevar guantes, prendas, gafas o máscara de protección.
- P401** Almacenar lejos de alimentos, bebidas y piensos.

9. Condiciones de almacenamiento

Conservar el producto en su envase original cerrado, en un lugar seco y entre 0 °C y 45 °C.

**UTILÍCESE SOLAMENTE EN CASO DE RECONOCIDA NECESIDAD.
NO DEBE SOBREPASARSE LA DOSIS DE APLICACIÓN.**

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.