

FICHA TÉCNICA

1. Producto:

Nombre: **PRESTOP® WG**



2. Número de registro:

ES-01626

Producto utilizable en agricultura ecológica de conformidad
con el Reglamento (UE) 2018/848 y 2021/1165.

3. Composición:

Clonostachys rosea cepa J1446, 1×10^9 UFC/g (900 g/kg) [WG] P/P

4. Formulación:

Gránulo dispersable en agua (WG).

5. Descripción:

PRESTOP® WG es un biofungicida basado en el microorganismo *Clonostachys rosea* cepa J1446. Su modo de acción se basa en la competencia por el espacio, los nutrientes o los sustratos con los patógenos y en la producción de enzimas líticas. Su efecto es idealmente preventivo, aunque también presenta eficacia con la enfermedad declarada. Tiene actividad preventiva tanto en la rizosfera como en la parte foliar de los cultivos.

6. Clasificación toxicológica:

Contiene *Clonostachys rosea* cepa J1446. Es potencialmente sensibilizante por vía cutánea y por vía inhalatoria.

No usar en combinación con otros productos. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P262: Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.

P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

7. Presentación:

Envases de 100 Y 500 g

8. Aplicaciones autorizadas, dosis y modo de empleo:

PRESTOP® WG está autorizado, en invernadero incluidas las estructuras semipermanentes, para su aplicación mediante pulverización foliar, riego por goteo, hidroponía, aplicación directa a cuellos y tallos ("cacharreo") o incorporación al sustrato de siembra.

DOSIS GENERALES DE USO:

Pulverización foliar, 0,5 g/l

Riego por goteo, 400 g/ha

Hidroponía, 200 g/ha

Aplicación directa a cuellos y tallos ("cacharreo"), 0,5 g/l

Aplicación en sustrato de siembra, 0,1 g/l de sustrato.

CULTIVO / USO	ENFERMEDAD	P.S. (días)
Cebolla	<i>Fusarium spp.</i> , <i>Botrytis spp.</i>	1
Cucurbitáceas	<i>Fusarium spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i> , <i>Pythium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i> , <i>Botrytis spp.</i> , <i>Didymella spp.</i>	1
Especies vegetales (únicamente plantones de cucurbitáceas, tomate, pimientos, berenjena, hortalizas de hoja, lechuga, hierbas aromáticas, bulbos hortícolas, hortalizas del género brásica, tallos jóvenes y plantas ornamentales)	<i>Fusarium spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i> , <i>Pythium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i> , <i>Botrytis spp.</i>	1
Frondosas (exclusivamente plantones de árboles, incluidas coníferas y árboles de hoja caduca)	<i>Fusarium spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i> , <i>Pythium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i> , <i>Botrytis spp.</i>	NP
Hortalizas de hoja	<i>Fusarium spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i> , <i>Pythium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i> , <i>Botrytis spp.</i>	1
Lechuga	<i>Pythium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i>	1
Ornamentales herbáceas	<i>Fusarium spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i> , <i>Pythium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i> , <i>Botrytis spp.</i> , oídio	NP
Pimiento	<i>Fusarium spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i> , <i>Pythium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i> , <i>Botrytis spp.</i> , <i>Didymella spp.</i>	1

CULTIVO / USO	ENFERMEDAD	P.S. (días)
Tomate	<i>Fusarium spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i> , <i>Pythium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i> , <i>Botrytis spp.</i> , <i>Didymella spp.</i> , oídio	1
Achicoria (hojas)	<i>Thielaviopsis spp.</i>	NP
Bulbos hortícolas	<i>Pythium spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i>	1
Bulbos hortícolas (excepto <i>Allium sp.</i>)	<i>Fusarium spp.</i> , <i>Botrytis spp.</i>	1
Endibia	<i>Thielaviopsis spp.</i>	NP

USOS MENORES

Con respecto a los usos menores autorizados, la responsabilidad en relación con los fallos de eficacia o con la fitotoxicidad del producto para el que se haya autorizado el uso menor recaerá sobre la persona que utilice el producto fitosanitario, tal como se establece en el tercer párrafo del artículo 51.5 del Reglamento (CE) 1107/2009.

Berenjena	<i>Fusarium spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i> , <i>Pythium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i> , <i>Botrytis spp.</i> , <i>Didymella spp.</i> , oídio	1
Hierbas aromáticas y flores comestibles	<i>Fusarium spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i> , <i>Pythium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i> , <i>Botrytis spp.</i>	1
Hortalizas del género Brásica	<i>Fusarium spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i> , <i>Pythium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i> , <i>Botrytis spp.</i>	1
Tallos jóvenes	<i>Fusarium spp.</i> , <i>Botrytis spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i> , <i>Pythium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i> , oídio	1
Calabaza, canónigo, melón, pepino, tomate, raíz de perejil y tabaco	Según indicaciones de la etiqueta autorizada	1

9. Observaciones:

PRESTOP® WG debe aplicarse preferentemente de forma preventiva, antes de que los síntomas se hagan visibles o se acentúen, para favorecer la colonización de las raíces y de los órganos a proteger. Para pulverización, llenar el tanque hasta la mitad con agua limpia, activar y mantener la agitación, verter lentamente el producto, completar con agua y mantener la agitación durante la aplicación. Consultar al departamento técnico para más información sobre compatibilidad con otros productos. No usar en combinación con otros productos. **PRESTOP® WG** puede utilizarse en sistemas de gestión integrada de plagas y no tiene efectos nocivos sobre organismos beneficiosos u organismos no objetivo, incluidas las abejas.

10. Condiciones de almacenamiento y conservación del producto:

Mantener alejado de alimentos, bebidas y piensos. Mantener fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas. Conservar en el envase original cerrado y en lugar seco. PRESTOP® WG es un preparado orgánico que contiene esporas y micelio vivos y desecados de *Clonostachys rosea* cepa J1446. En su envase original, la caducidad es de al menos 12 meses a +20 °C y de 18 meses a +4 °C.

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.