FICHA TÉCNICA

1. Producto:

Nombre:	**WELGRO® MAR CREMA Ecoldpress**

Producto utilizable en agricultura ecológica de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/848 y 2021/1165.

2. Contenidos declarados:

EXTRACTO DE ALGAS LÍQUIDO LÍQUIDO CONCENTRADO DE ALGAS DE *ASCHOPHYLLUM NODOSUM*	
Residuo sólido	25% p/p
Ácido algínico	4% p/p
Potasio (K_2O) soluble en agua	1% p/p
Densidad	1,15
Materia orgánica	20% p/p
Materia inorgánica	7% p/p
Solubilidad	>99,5%
pH	6
Conductividad eléctrica	44 ds/m

3. Características:

WELGRO® MAR CREMA actúa como un estimulante para el cultivo, incrementando las funciones fisiológicas del mismo, así como mejorando su respuesta frente a condiciones adversas o procesos patológicos. Puede ser aplicado en pulverización foliar o en fertirrigación en todos los cultivos incluído el cultivo hidropónico.

4. Dosis y modo de empleo:

Mezcla: Agitar bien el producto antes de abrirlo. Llenar el tanque de aplicación con la mitad de la cantidad de agua necesaria. Comenzar la agitación del contenedor y añadir lentamente la cantidad necesaria de producto. Soluciones diluidas del producto deberán ser aplicadas en 24h.

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN	DOSIS
SEMILLEROS	Una vez germinadas las semillas.	30 cc/10 l (para 100 m²)
TOMATE, BERENJENA, PIMIENTO	Una aplicación en el trasplante y posteriores cada 15 días.	1,5-2 l/ha
PLATANERA	Efectuar 3-4 tratamientos desde la salida del invierno.	2-2,5 l/ha
PATATA	Primera aplicación a los 10 cm de planta. Repetir cada 15 días.	2 l/ha
CUCURBITÁCEAS	Iniciar con plantas a 3-4 hojas. Repetir cada 15 días.	1,5-2 l/ha

OTRAS HORTALIZAS DE HOJA, BRÁSICAS, TUBÉRCULOS, ALCACHOFA, ETC.	Primera aplicación a 3-4 hojas. Posteriormente cada 15-21 días.	1-2 l/ha (150 cc/hl)
FRESA, FRAMBUESA	Desde que la planta esté enraizada. Continuar cada 15 días.	1,5 l/ha
FRUTALES DE PEPITA	Botón rosa, inicio de floración y caída de pétalos.	1,5-2 l/ha (200 cc/hl)
FRUTALES DE HUESO	Inicio de floración, caída de pétalos y fruto cuajado.	1,5-2 l/ha (200 cc/hl)
CÍTRICOS	Desde brotación, 4 tratamientos.	2-2,5 l/ha (150 cc/hl)
OLIVO	Brotación, floración y cuajado (3 tratamientos).	2-2,5 l/ha (150 cc/hl)
VID Y PARRAL	En los estadios E-F, H y J.	1,5 l/ha
ALFALFA	Después de cada corte.	2,5 l/ha
CÉSPEDES	A la salida del invierno y después de cada corte.	4 l/ha
APLICACIONES EN FERTIRRIGACIÓN: SE RECOMIENDA UTILIZAR 3-4 L/HA.		

5. Presentación:

Envases de 1 Kg y 5 Kg.

6. Clasificación toxicológica:

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P261 Evitar respirar el polvo, la niebla.
P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.
P280 Llevar guantes de protección, ropa de protección.
P332+P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. Este producto puede manchar la piel tras la exposición prolongada.

7. Condiciones de almacenamiento:

Guarda el producto en el embalaje original cerrado en un lugar seco y protegido de temperaturas extremas (5-45ºC).

8. Compatibilidad:

No mezclar con aceites, ni con productos muy ácidos y usar dosis bajas en mezcla con azufres, productos a base de calcio y correctores metálicos.

UTILÍCESE SOLAMENTE EN CASO DE RECONOCIDA NECESIDAD.
NO DEBE SOBREPASARSE LA DOSIS DE APLICACIÓN.

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.