

FICHA TÉCNICA

1. Producto:

Nombre: **ROMECTIN®**

2. Número de registro:

23.574

3. Composición:

Abamectina, 1,8% p/v (18 g/l).
Contiene ciclohexanol y hidroxitolueno butilado (CAS 128-37-0).

4. Formulación:

Concentrado emulsionable (EC).

5. Descripción:

Insecticida-acaricida natural de acción translaminar y sistémica localizada, de amplio espectro con acción por contacto e ingestión.

6. Clasificación toxicológica:



ATENCIÓN

H302+H332 Nocivo en caso de ingestión o inhalación. H319 Provoca irritación ocular grave. H335 Puede irritar las vías respiratorias. H373 Puede provocar daños en el tiroides y sistema nervioso tras exposiciones prolongadas o repetidas. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. P260 No respirar la niebla de la pulverización. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P391 Recoger el vertido. P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. **El preparado no se usará en combinación con otros Productos.**

7. Presentación:

Envases de 1L y 5 L

8. Aplicaciones autorizadas, dosis y modo de empleo:

Tratamiento insecticida/acaricida en invernadero por pulverización foliar. Aplicar en pulverización normal mediante pistola pulverizadora, cañón exterior o mediante sistemas automáticos sin sobrepasar en ningún caso la dosis de 1l/ha en tomate y 1,2 l/ha para el resto de los cultivos. Para evitar problemas de resistencias, no tratar más de tres veces al año y alternar con acaricidas de distinto modo de acción. Se recomienda no utilizar abamectina en los cultivos de invernadero de noviembre a febrero.

USO	AGENTE	DOSIS	Nº APLICACIONES	INTERVALOS	VOL. CALDO	COND. ESPECÍFICO	P.S (días)	
Calabacín Melón Sandía	Ácaros Liriomiza (<i>Liriomyza spp.</i>)	0,05 - 0,1%	2	20 días	600-1200 l/ha	Aplicación en invernaderos permanentes	3	
Tomate, pimiento							7	
Fresal			2	14 días	500-1200 l/ha		7	
Ornamentales herbáceas			1	-	500-1200 l/ha		NP	
Berenjena			2	20 días	600-1200 l/ha		(Uso menor por jerarquía)	7
Pepino							Aplicación en invernaderos permanentes	3

Clasificación del modo de acción de las sustancias activas según IRAC:

GRUPO	6	INSECTICIDA
--------------	----------	--------------------

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.