

FICHA TÉCNICA

1. Producto:

Nombre: **TOWER®**

2. Número de registro:

25.667

Denominación común

Ulysses.

3. Composición:

Diflufenican 4% p/v (40 g/l) (34,8 g/kg); clortolurón 25% p/v (250 g/l) (217,4 g/kg);
Pendimetalina 30% p/v (300 g/l) (260,9 g/kg)
Contiene Pendimetalina y 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (CAS 2634-33-5). Puede provocar una
reacción alérgica.

4. Formulación:

Suspensión concentrada (SC).

5. Características:

Asociación herbicida de absorción foliar y radicular. Combina tres materias activas con
diferente modo de acción.

6. Clasificación toxicológica:



ATENCIÓN

H351 Se sospecha que provoca cáncer. H361d Se sospecha que daña al feto. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. P201+P102 Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. P260 No respirar los vapores. P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P280 Llevar guantes y prendas de protección. P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P391 Recoger el vertido. P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. **El preparado no se usará en combinación con otros productos.**

7. Presentación:

Envases de 5 L.

8. Aplicaciones autorizadas, dosis y modo de empleo:

Herbicida empleado en pre o post-emergencia de las malas hierbas. Resulta selectivo en trigo, cebada, centeno y triticale. Realizar una sola aplicación por campaña en cereales de invierno mediante pulverización normal con tractor empleando un volumen de caldo de 200-400 l/ha en post-emergencia temprana del cultivo.

CULTIVO	AGENTE	Nº APPLIC.	DOSIS (l/ha)	VOLUMEN DE CALDO (l/ha)	CONDICIONAMIENTOS ESPECÍFICOS	P.S (días)
Centeno Triticale	Malas hierbas	1	2	200-400	-	NP
Cebada Trigo	Malas hierbas		2		En cebada de invierno y trigo de invierno se podrá realizar una aplicación en post-emergencia temprana del cultivo, o bien realizar dicha aplicación en preemergencia del cultivo, desde BBCH 00 (semilla seca) hasta BBCH 07 (coleóptilo emergido de la semilla)	NP

Clasificación del modo de acción de las sustancias activas según WSSA y HRAC:

GRUPO	12	5	3	HERBICIDA
-------	----	---	---	-----------

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.