

FICHA TÉCNICA

1. Producto:

Nombre: **TELET TRIO®**

2. Número de registro:

ES-00371

Denominación común

TRAXOS ONE

3. Composición:

30 g/l (3% p/v) de Pinoxaden (2,94% p/p) + 30 g/l (3% p/v) de Clodinafop-propargil (2,94% p/p) + 7,5 g/l (0,75% p/v) de Florasulam (0,73% p/p).

Contiene 0,73% p/p del antídoto cloquintocet-mexil (CAS 99607-70-2).

4. Formulación:

Emulsión concentrada (EC).

5. Descripción:

TELET TRIO® es un herbicida de post-emergencia para el control de gramíneas y dicotiledóneas en el cultivo del trigo en forma de emulsión concentrada (EC), compuesto por las sustancias activas Pinoxaden, Clodinafop-propargil y Florasulam y el antídoto Cloquintocet-mexil. El producto es absorbido por las hojas de las malas hierbas y se trasloca rápidamente hacia los tejidos meristemáticos donde se acumula interfiriendo en el desarrollo de las malas hierbas sensibles. Las gramíneas sensibles detienen su crecimiento a las 48 horas de la aplicación. Entre una y tres semanas después pueden observarse los síntomas de la actividad del producto: decaimiento de la planta, clorosis y necrosis de las hojas más jóvenes. La eliminación de las malas hierbas será completa transcurridas de tres a cinco semanas desde la aplicación. **TELET TRIO®** es una formulación lista para su uso, y no requiere la adición de coadyuvantes.

6. Clasificación toxicológica:



ATENCIÓN

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H361d Se sospecha que daña al feto.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol. P280 Llevar guantes, prendas y mascarilla de protección.
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P201+P202 Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
P391 Recoger el vertido.
P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

7. Presentación:

Envase de 5 L

8. Aplicaciones autorizadas, dosis y modo de empleo:

TELET TRIO se recomienda para el control de malas hierbas gramíneas y de hoja ancha en cultivos de trigo en postemergencia, desde el comienzo del ahijamiento/macollamiento hasta el segundo nudo perceptible, a 2 cm del primero. TELET TRIO controla gramíneas como *Avena spp*, *Lolium spp*, *Phalaris spp* y *Alopecurus myosuroides* y dicotiledóneas como *Galium aparine*, *Sinapis arvensis*, *Matricaria spp*, *Anthemis arvensis*, *Capsella bursa-pastoris*, *Diplotaxis spp*, *Raphanus raphanistrum*, *Stellaria media* entre otras. La dosis a aplicar dependerá de la mala hierba objetivo y del estado en el que ésta se encuentre. La cantidad de agua por hectárea puede estar comprendida entre 200 y 400 l/ha. La aplicación se realizará en pulverización normal con tractor con una presión no inferior a 2,5 atm estando la máquina provista de boquillas de abanico planas de acuerdo al volumen y velocidad deseados. Con cantidades de agua inferiores, se pueden obtener controles irregulares. Se recomienda aplicar TELET TRIO con el cultivo y las malas hierbas en buen estado de crecimiento y que no estén afectados por salinidad del suelo, estrés hídrico, heladas, plagas y enfermedades, u otros factores adversos. Contra Vallico utilizar las dosis más altas y realizar las aplicaciones lo más temprano posible. NO APLICAR EN OTOÑO.

Cultivo	Plagas/Efecto	Momento de aplicación	Nº de aplicaciones	Dosis (l/ha)	Volumen de caldo (l/ha)	P.S (días)
Trigo (incluido trigo duro)	Malas hierbas (dicotiledóneas y monocotiledóneas)	Post-emergencia (desde inicio del macollamiento hasta el segundo nudo perceptible, a 2 cm del primero)	1	0,67 - 1	200 - 400	NP

9. Preparación del caldo:

Llenar el tanque con agua hasta una tercera parte de su capacidad. Añadir la cantidad necesaria de producto según las dosis autorizadas y terminar de llenar con el agitador en funcionamiento hasta la completa disolución. No dejar de agitar el caldo hasta el momento de su uso. Utilizar el caldo el mismo día de su preparación.

10. Método de aplicación:

Una vez preparado el caldo herbicida, se aplica mediante un aparato pulverizador con barra de aplicación para herbicidas, accionado a baja presión y provisto de agitador. Es necesario aplicar con maquinaria en perfecto estado de funcionamiento, con las boquillas bien calibradas, de forma que permita una correcta y uniforme distribución del producto sobre la parcela a tratar.

Durante la aplicación debe evitarse pasar dos veces por el mismo sitio, es decir, no deben efectuarse solapes o dobles pasadas.

Asegúrese de mantener el mismo caudal de salida durante todo el tratamiento. Evite las sobredosificaciones. En el caso de detenciones accidentales, o averías, durante la aplicación, corte inmediatamente la pulverización y salga con el equipo de la parcela.

11. Limpieza del equipo de aplicación:

Una vez preparado el caldo herbicida, se aplica mediante un aparato pulverizador con barra de aplicación para herbicidas, accionado a baja presión y provisto de agitador. Es necesario aplicar con maquinaria en perfecto estado de funcionamiento, con las boquillas bien calibradas, de forma que permita una correcta y uniforme distribución del producto sobre la parcela a tratar.

Durante la aplicación debe evitarse pasar dos veces por el mismo sitio, es decir, no deben efectuarse solapes o dobles pasadas.

Asegúrese de mantener el mismo caudal de salida durante todo el tratamiento. Evite las sobredosificaciones. En el caso de detenciones accidentales, o averías, durante la aplicación, corte inmediatamente la pulverización y salga con el equipo de la parcela.

12. Manejo de resistencias:

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, SA recomienda el uso sostenible y responsable. La lectura y comprensión de la etiqueta es clave para un buen uso del producto. COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, SA es socio colaborador en la Sociedad Española de Malherbología y partícipe activo en su Comité de Prevención de Resistencias a Herbicidas (CPRH). COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, SA insta seguir las pautas que este foro con carácter técnico-científico recomienda: El Comité para la Prevención de Resistencias a Herbicidas recomienda para prevenir los casos de resistencia a los herbicidas: Utilizar la rotación de cultivos alternando, si es posible, cultivos de siembra de otoño con cultivos de siembra de primavera y verano, así como de especies diferentes. / Técnicas culturales: laboreo profundo, segado, modificación de las fechas de siembra... / Alternancia, limitación y modos de acción: evitando la aplicación continua del mismo herbicida, limitar el número de aplicaciones en una misma temporada, evitar el uso de dosis subletales o fuera de etiqueta, emplear herbicidas con distinto modo de acción, activos contra las mismas malas hierbas, y coincidir las aplicaciones herbicidas con momentos de plena actividad metabólica de las hierbas a controlar.

Clasificación del modo de acción de las sustancias activas según HRAC/WSSA:

GRUPO	1 1 2	HERBICIDA
--------------	--------------	------------------

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.