

FICHA TÉCNICA

1. Producto:

Nombre: **MONCUT® SC**

2. Número de registro:

25.146

3. Composición:

Flutolanil 46% p/v (460 g/l)
Contiene 1,2-benzisotiazol-3-(2H)-ona nº CAS: 2634-33-5.

4. Formulación:

Suspensión concentrada (SC)

5. Descripción:

Fungicida sistémico de elevada persistencia con acción preventiva y curativa contra *Rhizoctonia solani* y otros hongos basidiomicetos. MONCUT® SC es absorbido por las raíces y es traslocado hacia el cuello de la planta (sistemía ascendente), protegiendo de esta forma las partes más sensibles de los cultivos del ataque de Rhizoctonia.

6. Clasificación toxicológica:



ATENCIÓN

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
P261 Evitar respirar la niebla.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
P391 Recoger el vertido.
P501 Eliminar el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

El preparado no se usará en combinación con otros productos

7. Presentación:

Envases de 1 L

8. Aplicaciones autorizadas, dosis y modo de empleo:

Uso profesional agrario. Autorizado para tratamientos fungicidas al aire libre e invernadero por pulverización con tractor y manual, y en riego por goteo.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS DE UTILIZACIÓN	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN	P.S (días)
Patata	Viruela, sarna de la patata, Rhizoctonia solani	1,25 -1,875 l/ha	Aplicar al aire libre, mediante pulverización normal con tractor del tubérculo y del surco en el momento de la siembra, en una aplicación por campaña. Utilizar 100 l de caldo por ha. Aplicar durante BBCH 00-03.	NP
Haba verde y judía verde	Rhizoctonia spp.	0,75 - 1,5 l/ha	Aplicar al aire libre, en incorporación a través del riego por goteo. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 15 días entre ellas. Utilizar 1000-5000 l de caldo por ha. Aplicar durante BBCH 13-15 (3ª hoja verdadera desplegada a 5 hojas desplegadas).	3
Pimiento	Rhizoctonia spp.	0,75 - 1,5 l/ha	Aplicar al aire libre, en incorporación a través del riego por goteo, en una aplicación por campaña. Utilizar 1000-5000 l de caldo por ha. Aplicar durante BBCH 13-15 (3ª hoja verdadera desplegada a 5 hojas desplegadas).	47
Esquejes (Exclusivamente para esquejes de alcachofa)	Rhizoctonia spp.	125 - 150 ml/hl	Aplicar al aire libre o en invernadero, mediante pulverización manual dirigida a los esquejes antes del trasplante, en una aplicación por campaña. Aplicar durante BBCH 00-05.	NP
Clavel	Rhizoctonia spp.	1,25 ml/hl	Aplicar al aire libre, mediante pulverización manual en la zona de trasplante dirigida al cuello de la planta, en una aplicación por campaña. Utilizar 50-60 l de caldo por ha. Aplicar durante BBCH 00-13.	NP

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.