

## FICHA TÉCNICA

### **NOMBRE DEL PRODUCTO**

---

ALIADO®CF

### **NÚMERO DE REGISTRO**

---

ES-01260- Denominación común del producto DARAMUN

### **COMPOSICIÓN**

---

Ciazofamida 10% p/v

### **FORMULACIÓN**

---

Suspensión concentrada (SC).

### **DESCRIPCIÓN**

---

**ALIADO® CF** es un fungicida de contacto en forma de suspensión concentrada a base de ciazofamida, perteneciente a la familia de los Ciano-imidazoles, muy activa sobre hongos Oomicetos

Presenta acción preventiva contra todos los estadios del ciclo biológico del mildiu de la patata y del tomate (*Phytophthora infestans*), así como contra el mildiu de la vid (*Plasmopara viticola*). Inhibe la respiración del hongo en un lugar concreto de las mitocondrias, siendo efectivo sobre la formación de los zoosporangios, germinación de las esporas y posterior del crecimiento del micelio.

### **CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA**

---



**ATENCIÓN**

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.  
P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol.  
P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.  
P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.  
P391 Recoger el vertido.  
P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.  
EUH208: Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (CAS 2634-33-5) y mezcla de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (CAS 55965-84-9).  
Puede provocar una reacción alérgica.

### **PRESENTACIÓN**

---

Envases 1 L y 5 L

## FICHA TÉCNICA

### MODO DE EMPLEO, DOSIS Y APLICACIONES AUTORIZADAS

Tratamiento fungicida al aire libre e invernadero por pulverización foliar mecánica y manual en los siguientes cultivos:

Cultivo	Enfermedad	Dosis (l/ha)	Nº aplicaciones (intervalo en días)	Volumen de Caldo (l/ha)	Forma y época de aplicación	Plazo de Seguridad (días)
Patata	Mildiu	0,8	6 (cada 5 días)	200 - 500	Uso al aire libre. Aplicación mecánica y manual. Eficaz frente a <i>Phytophthora infestans</i> . Aplicar durante BBCH 12- 89.	7
Tomate	Mildiu	0,8	6 (cada 7 días)	Aire libre: 400 - 600	Uso al aire libre. Aplicación mecánica y manual. Eficaz frente a <i>Phytophthora infestans</i> . Aplicar durante BBCH 12- 89	3
				Invernadero: 400-1.000	Uso en invernadero permanente y/o túnel bajo (minitúnel), malla de protección, túnel alto (walk-in). Aplicación manual. Eficaz frente a <i>Phytophthora infestans</i> . Aplicar durante BBCH 12- 89.	
Vid	Mildiu	0,9	1	300 – 1.000	Uso al aire libre. Aplicación mecánica y manual. Eficaz frente a <i>Plasmopara viticola</i> . Aplicar durante BBCH 11- 89	21

### MANEJO DE RESISTENCIAS

A fin de evitar resistencias se recomienda alternar este producto con otros fungicidas con distinto modo de acción.

Clasificación del modo de acción de las sustancias activas según FRAC:

GRUPO	21	FUNGICIDA
-------	----	-----------

**Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.**