

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

ACTIVUS®SC

NÚMERO DE REGISTRO

25.551 – Denominación común del producto ÓRDAGO SC.

COMPOSICIÓN

PENDIMETALINA 40% p/v (400 g/l)
Contiene 1,2-benzisotiazol-3 (2H)-ona (CAS 2634-33-5).

FORMULACIÓN

Suspensión concentrada (SC).

DESCRIPCIÓN

Herbicida preemergente de las malas hierbas y selectivo en múltiples cultivos.

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA



ATENCIÓN

H361d Se sospecha que daña al feto.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
P261 Evitar respirar la niebla de pulverización.
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
P391 Recoger el vertido.
P201+P202 Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
P280 Llevar guantes y prendas de protección.
P391 Recoger el vertido.
P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo con a normativa sobre residuos peligrosos.

PRESENTACIÓN

Envases de 1, 5 y 20L

APLICACIONES AUTORIZADAS, DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicar mediante pulverización al suelo a baja presión a las dosis especificadas en pre-emergencia o post-emergencia precoz y con un volumen de caldo comprendido entre los 200-600 l/ha. Se recomienda utilizar la dosis más alta en suelos con alto contenido en materia orgánica o arcilla y las dosis más bajas en suelos ligeros. Realizar una sola aplicación por campaña y después de la aplicación, el producto debe ser incorporado al suelo por el riego, lluvia o de forma mecánica.

FICHA TÉCNICA

Cultivos	Condicionamientos	Dosis	P.S (*)
Ajos y maíz	Aplicar en pulverización normal, dirigido al suelo en preemergencia o post-emergencia temprana (1-3 hojas), y en una sola aplicación por campaña.	3 - 5 l/ha	NP
Cebolla de siembra directa	Aplicar en pulverización normal, dirigida al suelo en preemergencia o post-emergencia temprana (1-3 hojas), y en una sola aplicación por campaña.	2,5 - 4 l/ha	NP
Alcachofa, apio, brécol, cebolla de trasplante, coliflor y repollo	Aplicar en pulverización normal dirigida al suelo, realizando una única aplicación por campaña en pre-trasplante.	2,5 - 4 l/ha	NP
Soja y girasol	Aplicar en pulverización normal dirigida al suelo, realizando una única aplicación por campaña en presiembra.	3 - 5 l/ha	NP
Algodonero, guisantes y judías para grano	Aplicar a en pulverización normal dirigida al suelo o presiembra en una sola aplicación por campaña.	3 - 5 l/ha	NP
Almendro, avellano, caqui, castaño, nogal, nuez de Pecán, pino piñonero y pistacho *	Realizar una sola aplicación mediante pulverización dirigida al suelo antes de floración. <i>Ver nota.</i>	3 - 5 l/ha	NP
Altramuz (seco y verde) *	Solo al aire libre. Realizar una sola aplicación mediante pulverización dirigida al suelo en presiembra o pre-emergencia. <i>Ver nota.</i>	3 - 5 l/ha	NP
Berenjena *	Solo al aire libre. Realizar una sola aplicación mediante pulverización dirigida al suelo en pre-transplante o post-transplante (entre líneas). <i>Ver nota.</i>	2,5 - 4 l/ha	NP
Boniato *	Realizar una sola aplicación mediante pulverización dirigida al suelo en pre-emergencia. <i>Ver nota.</i>	3 - 5 l/ha	NP
Cártamo, chalote y colza *	Realizar una sola aplicación mediante pulverización dirigida al suelo en pre-emergencia o post-emergencia temprana (1-3 hojas). <i>Ver nota.</i>	2,5 - 4 l/ha	NP
Mijo y sorgo *		3 - 5 l/ha	
Pimiento	Aplicar en pulverización normal dirigida al suelo, realizando una única aplicación por campaña en pre-trasplante.	3 - 5 l/ha	NP
Cebada, patata y trigo	Aplicar en pulverización normal con tractor y manual dirigida al suelo en preemergencia en una sola aplicación por campaña.	3 - 5 l/ha	NP
Cebolleta, cebollino, coles de bruselas y puerro *	Realizar una sola aplicación mediante pulverización dirigida al suelo antes del trasplante. <i>Ver nota.</i>	2,5 - 4 l/ha	NP
Cítricos, frutales de hueso y frutales de pepita	Aplicar en pulverización normal dirigida al suelo, realizando una única	3 - 5 l/ha	NP

FICHA TÉCNICA

Cultivos	Condicionamientos	Dosis	P.S (*)
	aplicación por campaña en post-emergencia (pre-floración).		
Fresal	Aplicar en pulverización normal dirigido al suelo, realizando una única aplicación por campaña en pre-trasplante o post-trasplante al final de la parada invernal.	3 - 5 l/ha	NP
Frutas subtropicales y tropicales: cocotero, cajú (productor de anacardos), macadamia *	Realizar una sola aplicación mediante pulverización dirigida al suelo antes de la floración. <i>Ver nota.</i>	3 - 5 l/ha	NP
Garbanzo (incluye garbanzos verdes) *	Solo aire libre. Realizar una sola aplicación mediante pulverización dirigida al suelo en presiembra o pre-emergencia. <i>Ver nota.</i>	3 - 5 l/ha	NP
Girasol, soja	Pulverización normal dirigida al suelo, realizando una única aplicación por campaña en presiembra.	3 - 5 l/ha	NP
Guisantes verdes (secos y con vaina) *	Solo aire libre. Realizar una sola aplicación mediante pulverización dirigida al suelo en presiembra o pre-emergencia. <i>Ver nota.</i>	3 - 5 l/ha	NP
Habas para grano, judías verdes *	Solo aire libre. Realizar una sola aplicación mediante pulverización dirigida al suelo en presiembra o pre-emergencia. <i>Ver nota.</i>	3 - 5 l/ha	NP
Habas verdes (con o sin vaina) *	Solo aire libre. Realizar una sola aplicación mediante pulverización dirigida al suelo en presiembra o pre-emergencia. <i>Ver nota.</i>	3 - 5 l/ha	NP
Leguminosas forrajeras (alverja, yeros, veza, haba forrajera, trébol, soja, guisante, altramuz, almorta, esparceta y zulla) *	Solo aire libre. Realizar una sola aplicación mediante pulverización dirigida al suelo en presiembra o pre-emergencia. <i>Ver nota.</i>	3 - 5 l/ha	NP
Lentejas (incluye lentejas verdes) *	Solo aire libre. Realizar una sola aplicación mediante pulverización dirigida al suelo en presiembra o pre-emergencia. <i>Ver nota.</i>	3 - 5 l/ha	NP
Otros frutales de hoja caduda: <i>Bertholletia excelsa</i> (nuez de Brasil) *	Realizar una sola aplicación mediante pulverización dirigida al suelo antes de la floración. <i>Ver nota.</i>	3 - 5 l/ha	NP
Tabaco (contra malas hierbas)	Aplicar en pulverización normal dirigida al suelo, realizando una única aplicación por campaña en pre-trasplante o post-trasplante entre líneas.	3 - 5 l/ha	NP
Tabaco (deshijado)	Aplicar en pulverización normal dirigida al suelo, al aparecer las primeras flores, en una sola aplicación por campaña.	10 cc/l	21
Tomate	Aplicar en pulverización normal dirigida al suelo, realizando una única aplicación por campaña en pre-trasplante, o post-trasplante entre líneas.	2,5 - 4 l/ha	NP

FICHA TÉCNICA

Cultivos	Condicionamientos	Dosis	P.S (*)
Vid	Aplicar en pulverización normal dirigida al suelo, realizando una única aplicación por campaña al final del letargo.	3 - 5 l/ha	NP

P.S: Plazo de seguridad (días). / Nota: *Con respecto a los usos menores autorizados; frutales de cáscara (almendro, *Bertholletia excelsa* (nuez de Brasil), cajú (productor de anacardos), castaño, cocotero, avellano, nuez del pecán, macadamia, pino, pistachero y nogal), caqui, puerro, chalote, cebolleta, cebollino, colza, cártamo, coles de bruselas, judías verdes, habas verdes (con y sin vaina) y habas para grano, guisantes con vaina y guisantes secos, garbanzos (incluye garbanzos verdes), lentejas (incluye lentejas verdes) y altramuces (incluye altramuces verdes), leguminosas forrajeras (alverja, yeros, veza, haba forrajera, trébol, soja, guisante, altramuz, almorta, esparceta y zulla) boniato, mijo, sorgo y berenjena. La responsabilidad en relación con los fallos de eficacia o con la fitotoxicidad del producto para el que se haya concedido el uso menor recaerá sobre la persona que utilice el producto fitosanitario tal y como se establece en el tercer párrafo del artículo 51.5 del Reglamento (CE) 1107/2009.

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.