

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

TARMILO

NÚMERO DE REGISTRO

25.830 – Denominación común del producto CUSTODIA.

COMPOSICIÓN

Azoxistrobin 12% p/v (120 g/l), Tebuconazol 20% p/v (200 g/l).
Contiene 1,2-bencisotiazolin-3(2H)-ona (CAS 2634-33-5)

FORMULACIÓN

Suspensión concentrada (SC).

DESCRIPCIÓN

Fungicida antioidio.

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA



H302 Nocivo en caso de ingestión.

H361d Se sospecha que daña al feto.



H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
P201+P202 Pedir instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

P261 Evitar respirar la niebla.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P280 Llevar guantes y prendas de protección.

P391 Recoger el vertido.



ATENCIÓN

PRESENTACIÓN

Envases de 1 y 5L.

FICHA TÉCNICA

APLICACIONES AUTORIZADAS, DOSIS Y MODO DE EMPLEO

En tomate, berenjena, calabacín, melón, pepino, pimiento, ajos y cebolla aplicar mediante pulverización manual únicamente mientras el desarrollo del cultivo sea inferior a 1 m de altura. En vid aplicar mediante pulverización normal con tractor o manual con mochila desde BBCH 20 (a partir de 9 o más hojas, desplegadas) hasta BBCH 75 (bayas de tamaño guisante (arvejas); los racimos colgantes). En trigo y triticale aplicar en pulverización normal con tractor.

USO	AGENTE	DOSIS	INTERVALO ENTRE APLICACIONES	VOLUMEN DE CALDO (l/ha)
Tomate, berenjena, melón, calabacín y pepino (todos en invernadero)	Oídio	0,5 – 0,9 l/ha	10 – 14 días	500-1000 l/ha
	Máximo de aplicaciones por campaña: 3 Plazo de seguridad: 3 días (en melón PS: 7 días)			
Pimiento (invernadero)	Oídio	0,5 – 0,9 l/ha	10 – 14 días	500-1000 l/ha
	Máximo de aplicaciones por campaña: 2 Plazo de seguridad: 3 días			
Ajos y cebolla (ambos en invernadero)	Roya	0,5 – 0,9 l/ha	15 días	500-1000 l/ha
	Máximo de aplicaciones por campaña: 2 Plazo de seguridad: 3 días			
Trigo y triticale	Septoria, oídio, roya, fusariosis	1-1,25 l/ha	14-21 días	100-500 l/ha
	Máximo de aplicaciones por campaña: 2 Plazo de seguridad: 35 días			
Cebada	Oídio, roya, rincosporiosis y mancha foliar	1-1,25 l/ha	14-21 días	100-500 l/ha
	Máximo de aplicaciones por campaña: 2 Plazo de seguridad: 35 días			
Vid (vid de mesa y de vinificación)	Máximo de aplicaciones por campaña: 2 Plazo de seguridad: 21 días	0,75 l/ha	14 días	500-1.000 l/ha
	Máximo de aplicaciones por campaña: 2 Plazo de seguridad: 21 días			

OBSERVACIONES

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

Clasificación del modo de acción de las sustancias activas según FRAC:

GRUPO	11	3	FUNGICIDA
--------------	-----------	----------	------------------

FICHA TÉCNICA

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.