

## FICHA TÉCNICA

### 1. Producto:

Nombre: **ECLIPSE® 70 WG**

### 2. Número de registro:

22.065

### 3. Composición:

Metribuzina 70 % p/p (700 g/Kg).

### 4. Formulación:

Gránulos dispersables en agua (WG).

### 5. Descripción:

Herbicida selectivo de pre y post-emergencia temprana.

### 6. Clasificación toxicológica:



**ATENCIÓN**

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. P261 Evitar respirar la niebla de pulverización. P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. P280 Llevar guantes, prendas y mascarilla de protección. P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P391 Recoger el vertido. P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

### 7. Presentación:

Envases de 100 g y 500 g

## 8. Aplicaciones autorizadas, dosis y modo de empleo:

CULTIVO	MALAS HIERBAS	DOSIS (Kg/ha)	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN	P.S.
Alfalfa	Malas hierbas hierbas dicotiledóneas anuales y monocotiledóneas anuales.	0,75	Aplicar durante el reposo invernal, antes de la brotación, en cultivos de más de 2 años.	NP
Cebada de ciclo largo y trigo de ciclo largo		0,1	Aplicar en pre-emergencia o post-emergencia del cultivo a partir de estado de 3 hojas	NP
Patata		0,75	Aplicar en pre-emergencia del cultivo a 0,75 kg/ha o en post-emergencia a 0,3 kg/ha	NP
Soja		0,25-0,35	Aplicar en pre-emergencia del cultivo	NP
Tomate		0,5-0,75	Aplicar en pre-plantación o en post-emergencia, cuando ya esté bien enraizado. En caso de siembra directa, aplicar en pre-emergencia, inmediatamente después de la siembra.	NP
Zanahoria		0,25-0,35	Aplicar en preemergencia del cultivo	60

## 9. Observaciones:

Aplicar al suelo en pulverización a baja presión, en cultivos al aire libre, diluyendo la dosis en 200-500 litros de caldo/ha, en una aplicación por campaña.

En patata se puede utilizar en las siguientes variedades: Desirée, King Edward, Red Pontiac, Quenebec, Arran Barner, Royal Kidney, Etoile de León, Palogan, Claudia, Herder y Ostara. No utilizar en Jaerla.

Cuando se aplica en preemergencia el suelo debe estar suficientemente húmedo o habiéndose producido una lluvia ligera. Si los días son muy calurosos, retrasar la aplicación hasta el atardecer.

No utilizar en suelos muy arenosos o que contengan menos del 2% de materia orgánica.

## 10. Precauciones:

En suelos pedregosos hay riesgo de producir daños al cultivo, especialmente, si acontece una lluvia fuerte después de la aplicación. En suelos con alto contenido en materia orgánica la acción remanente del producto puede verse reducida.

Algunas variedades de cultivos autorizados, pueden ser sensibles al tratamiento de post-emergencia, si éstos se encuentran debilitados.

No es aconsejable realizar mezclas altamente concentradas ni mezclar con fertilizantes.

El equipo de pulverización no debe presentar restos de otros preparados, y en particular, restos de herbicidas hormonales.

No verter el caldo sobrante de pulverización en las cercanías de plantas cultivadas y evitar la contaminación de aguas.

No cultivar especies sensibles hasta pasados 4 meses desde la aplicación del herbicida; se consideran cultivos sensibles: apio, cebolla, cucurbitáceas, fresa, girasol, guisante, judía, lino, maíz, remolacha, tabaco, batata, crucíferas, frutales, platanera y vid.

**Clasificación del modo de acción de las sustancias activas según WSSA y HRAC:**

<b>GRUPO</b>	<b>5</b>	<b>HERBICIDA</b>
--------------	----------	------------------

**Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.**