

FICHA TÉCNICA

1. Producto:

Nombre: **NETÓN®**

2. Número de registro:

ES-00215

Denominación común

Benelus.

3. Composición:

Ciprodinil 187,5 g/l - 18,75% p/v (182,7 g/kg) + Tebuconazol 125 g/l - 12,5% p/v (121,8 g/kg).

4. Formulación:

Concentrado emulsionable (EC)

5. Características:

Fungicida sistémico para el control de moteado, monilia y Botrytis.

6. Clasificación toxicológica:



H319 Provoca irritación ocular grave. H361d Se sospecha que daña al feto. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. P201+P202 Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. P261 Evitar respirar la niebla de pulverización. P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P280 Llevar guantes de protección química y prendas de protección. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P391 Recoger el vertido. P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. **El preparado no se usará en combinación con otros productos.**

ATENCIÓN

7. Presentación:

Envases de 1 L y 5 L.

8. Aplicaciones autorizadas, dosis y modo de empleo:

Tratamiento al aire libre mediante pulverización mecánica en los siguientes cultivos:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (VOLUMEN DE CALDO (l/ha)	CONDICIONAMIENTOS ESPECÍFICOS	P.S (días)
Manzano	Moteado o roña del manzano (<i>Venturia inaequalis</i>)	0,06-0,12 l/hl	800-1000	Realizar una aplicación por campaña durante los estadios BBCH 10-85 sin superar la dosis máxima de 1,2 l/ha.	60
Peral	Moteado o roña del peral (<i>Venturia pyrina</i>)	0,06 - 0,08 l/hl	800	Realizar una aplicación por campaña durante los estadios BBCH 10-85 sin superar la dosis máxima de 0,65 l/ha.	60
Melocotonero y nectarino	Monilia (<i>Monilinia spp.</i>)	0,06-0,1 l/hl	800-1.500	Realizar una aplicación por campaña durante los estadios BBCH 51-85 sin superar la dosis máxima de 1,5 l/ha.	14
Vid (uva de mesa y de vinificación)	<i>Botrytis spp.</i>	1 l/ha	500-1.000	Realizar una aplicación por campaña durante los estadios BBCH 75-85.	28

9. Observaciones:

Utilizar únicamente fungicidas en situaciones en las que el riesgo o la presencia de una enfermedad justifiquen el tratamiento. Utilizar dosis efectiva para el control de la enfermedad y que sea apropiada para la presión de la enfermedad. Evitar aplicaciones repetidas del mismo producto o modo de acción y nunca exceder el número máximo recomendado de aplicaciones. Alternar con fungicidas de diferente modo de acción. Monitorear los cultivos regularmente para detectar la enfermedad y tratar antes de que la infección esté bien establecida. El líquido de pulverización debe agitarse constantemente. Proteger de las heladas.

Clasificación del modo de acción de las sustancias activas según FRAC:

GRUPO	9	3	FUNGICIDA
-------	---	---	-----------

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.