

## FICHA TÉCNICA

### NOMBRE DEL PRODUCTO

BIOBIT 32

### NÚMERO DE REGISTRO

24.520

### COMPOSICIÓN

Bacillus thuringiensis var. kurstaki, (cepa ABTS-351) 54% (32 millones de CLU/g)

### FORMULACIÓN

Granulado dispersable en agua (WG).

### CARACTERÍSTICAS

BIOBIT® 32 es un insecticida biológico en forma de granulado dispersable en agua que contiene toxina cristalina y esporas de *Bacillus thuringiensis* var. *Kurstaki*. Gracias a su avanzada formulación, BIOBIT® 32 presenta mayor eficacia y acción residual.

### PRESENTACIÓN

Envases de 1 Kg.

### APLICACIONES AUTORIZADAS Y MODO DE EMPLEO

Aplicar mediante pulverización normal o manual en cultivos al aire libre y mediante pulverización manual en cultivos de invernadero. El momento más oportuno para su aplicación es el principio de desarrollo de las larvas.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	Nº APLIC.	INTERVALOS (días)	VOL. CALDO (l/ha)	MOMENTO APLICACIÓN
Aire libre: Acelga, alcachofa, berza, brécol, col, col de china, coliflor, escarola, espinaca, lechuga, melón, puerro, sandía	Orugas	0,75 - 1 kg/ha	8	7-10	500-1.000	Aplicar desde la eclosión de las larvas.

## FICHA TÉCNICA

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	Nº APLIC.	INTERVALOS (días)	VOL. CALDO (l/ha)	MOMENTO APLICACIÓN
Algodonero	Orugas defoliadoras	0,5 - 1 kg/ha	5	7-10	500-1.000	Aplicar desde la eclosión de las larvas.
Arroz	Orugas	0,75 - 1 kg/ha	2	10	400-500	
Invernadero: Berenjena, calabacín, haba verde, judía verde, pepino, pimiento, tomate	Orugas	0,5 - 1 kg/ha (0,1-0,2 kg/hl)	8	7-10	-	
Cítricos	Prays y cacoecia	0,75 - 1 kg/ha	10	7-10	1.000-1.500	
Fresal (invernadero)	Orugas	0,75 - 1 kg/ha	8	7-10	800-1.000	

## FICHA TÉCNICA

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	Nº APLIC.	INTERVALOS (días)	VOL. CALDO (l/ha)	MOMENTO APLICACIÓN
Frutales de pepita	Arañuelo, carpocapsa, lagarta, orugas defoliadoras y orugueta	0,5 - 1 kg/ha	8	7-10	500-1.500	Aplicar desde la eclosión de las larvas.
Melocotonero	Arañuelo, carpocapsa, lagarta, orugas defoliadoras y orugueta	0,75 - 1 kg/ha	10	7-16	1.000-1.500	
Platanera	Orugas	0,75 - 1 kg/ha	10	7-16	1.000-1.500	
Olivo	Prays	0,75 - 1 kg/ha	2	7-10	1.000-1.500	
Ornamentales herbáceas	Orugas defoliadoras	0,75 - 1 kg/ha (0,1-0,2 kg/hl)	8	7-10	-	
Vid	Polilla del racimo	0,5 - 1 kg/ha	8	7-10	1.000-1.200	

### PLAZO DE SEGURIDAD

No procede.

Clasificación del modo de acción de las sustancias activas según IRAC:

GRUPO	11A	INSECTICIDA
-------	-----	-------------

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.