



RINIDI WG

GRÂNULOS DISPERSÍVEIS EM ÁGUA (WG)
COM 550 g/Kg DE DICAMBA OU 55% (p/p),
92 g/Kg DE NICOSSULFURÃO OU 9,2% (p/p),
23 g/Kg DE RIMSULFURÃO OU 2,3% (p/p).

HERBICIDA SELETIVO PARA A CULTURA DO MILHO

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL.
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE,
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Autorização de Venda n.º 1147 concedida pela DGAV

CONTÉM: 440 g

Data de produção e nº lote:
Ver embalagem

Titular da Autorização de Venda: SHARDA EUROPE B.V.B.A.
Jozef Mertensstraat, 142 - 1702 Dilbeek, Bélgica - Telefone: +32 (0) 664 444

Distribuído por: COMERCIAL QUÍMICA MASSO, S.A.



COMERCIAL QUÍMICA MASSO, S.A. - Delegação de PORTUGAL:
Rua de Janda, 65 - 4350-117 Porto - E-mail: franito@cqmasso.com
Tel.: +351 917 765 356 - Tel./Fax: +351 225 099 133

RINIDI WG

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS



ATENÇÃO



H319 Provoca irritação ocular grave. / H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. / P264 Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. / P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. / P280 Usar luvas de proteção, proteção ocular e proteção facial. / P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. / P337+P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. / P391 Recolher o produto derramado. / P501a Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. / EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido. / SP1 Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas. / SPe3 Para proteção das plantas não visadas, respeitar uma zona não pulverizada de 5 metros em relação às zonas não cultivadas. / SPe4 PT3 Para proteção das plantas aquáticas não visadas respeitar uma zona não pulverizada de 20 metros em relação às águas de superfície incluindo 20 metros de coberto vegetal. / SPPT5 Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas às zonas tratadas e à secagem do pulverizado. / SPoPT6 Após o tratamento lavar cuidadosamente as luvas, tendo cuidado especial em lavá-las por dentro.

Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) pelo telefone 800 250 250.

PRIMEIROS SOCORROS: Afas-se da zona de perigo. / Em caso de inalação: Em caso de dificuldade respiratória, contactar o INEM - 112 ou o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), telefone n.º 800 250 250. / Em caso de contacto com a pele: Remova todas as roupas contaminadas, lave imediatamente a zona exposta com água corrente. / Em caso de contacto com olhos: Lavar imediatamente durante 15 a 20 minutos sob água corrente, tendo cuidado para tirar as lentes de contacto. / Em caso de ingestão: Lavar a boca imediatamente com água. Não induza o vômito sem orientação médica. Entre em contacto com o INEM - 112 ou o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), telefone n.º 800 250 250. / Em todos os casos, se os sintomas persistirem ou se não se sentir bem, consulte de imediato um médico e mostre-lhe o rótulo e / ou a ficha de dados de segurança. / Em caso de intoxicação de animais, entre em contacto com seu veterinário.

Mantem em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

SPPT1 A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

NOTA: Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

HERBICIDA SELETIVO

INDICAÇÕES RELATIVAS À UTILIZAÇÃO DO PRODUTO (INCLUINDO AS PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS)

CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS: O produto RINIDI WG contém as substâncias ativas dicamba que pertence à família química do ácido benzóico (sal de sódio), nicosulfuron e rimsulfuron que pertencem à família química das sulfonilureias. É um herbicida sistémico, residual e de contacto. Tem ação sobre foliar e radicular, translocação rápida para os tecidos meristemáticos através do simploste e do apoplasto. Inibe o desenvolvimento celular (atua como o ácido indol-acético, IAA) e a biossíntese dos aminoácidos valina, leucina e isoleucina (por inibição da enzima acetolactato sintetase ALS).

UTILIZAÇÕES, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO: O RINIDI WG é um herbicida de pós-emergência eficaz no controlo das diversas infestantes de folha larga (dicotiledóneas) e infestantes gramíneas, anuais e perenes. A aplicação deverá ser feita em pulverização foliar, utilizando a dose de 440 g/ha (0,44 Kg/ha) aplicam em pós-emergência do milho, desde o estado de 3 a 9 folhas abertas (BBCH 13-19) e as infestantes na fase inicial de desenvolvimento. Realizar, no máximo, um tratamento por campanha, respeitando a dose indicada.

INFESTANTES SUSCEPTÍVEIS: Erva-aranha (*Amaranthus blitoides*), Moncos-de-perú (*Amaranthus retrofractus*), Cabossas (*Chenopodium album*), Milhã-pé-de-galo (*Echinochloa crus-galli*), Erva-pessegueira (*Polygonum persicaria*), Tasneirinha (*Senecio vulgaris*), Erva-moira (*Solanum nigrum*), Sorgo-bravo (*Sorghum halepense*) e Mougue-branca (*Stellaria media*).

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS: O RINIDI WG não pode ser aplicado na cultura de milho doce. No caso de campos de multiplicação de sementes de variedades híbridas de milho, deverá ser obtido aconselhamento prévio da empresa de sementes ou dos obtentores das variedades antes de se fazer a aplicação deste herbicida.

Evitar o arrastamento da nuvem de pulverização do produto para terrenos e/ou culturas vizinhas, como prevenção de eventuais problemas, podendo implementar-se uma zona tampão de cerca de 5 metros, para prevenir riscos possíveis para as culturas vizinhas não visadas.

Após a aplicação do RINIDI WG numa determinada parcela de terreno, deixar passar pelo menos 6 meses antes de semear ou plantar outra cultura, com a exceção de cereais de outono-inverno, que podem ser semeados antes desse período decorrido.

No caso de ocorrer a perda ocasional da cultura do milho onde foi aplicado este herbicida, só deverá ser semeado milho ou cereais de outono-inverno. Nesta circunstância, antes de se proceder novamente à sementeira, aconselha-se a realização de uma lavoura.

Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este herbicida ou qualquer outro que contenha estas substâncias ativas, mais de uma vez por ciclo cultural e proceder, sempre que possível, à utilização de herbicidas mistos ou à alternância de herbicidas de diferentes famílias químicas ou com modo de ação diferente.

Complementarmente à aplicação de RINIDI WG adotar práticas agrónomicas adequadas ao controlo de infestantes, tais como rotações culturais, métodos de controlo mecânico e outras técnicas culturais.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA: Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Deitar a quantidade de produto necessária e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação contínua.

MODO DE APLICAÇÃO: Calibrar corretamente o equipamento, assegurando a uniformidade na distribuição da calda no alvo biológico pretendido. Calcular o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas), com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda. A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as doses indicadas. Para diminuir o risco de arrastamento evitar pressões superiores a 2 Kg/cm² e/ou usar bicos anti-arrastamento.

Volume de calda a utilizar: 200-400 L/ha.