

FICHA TÉCNICA

1. Producto:

Nombre: **KANEMITE®**

2. Número de registro:

25.346

Denominación común

KANEMITE

3. Composición:

ACEQUINOCIL 16,4% p/v (164 g/l)
Contiene mezcla de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) (CAS 55965-84-9)

4. Formulación:

Suspensión Concentrada (SC)

5. Descripción:

KANEMITE® es un acaricida de contacto, específico contra ácaros tetránquidos (*Tetranychidae*), autorizado en manzano, peral, frutales de cáscara, melocotonero, nectarino, mandarino, naranja, berenjena y tomate. Perteneciente a una nueva familia de acaricidas, **KANEMITE®** posee una excelente actividad sobre todas las formas móviles (larvas, ninfas y adultos), con una marcada acción persistente.

6. Clasificación toxicológica:



ATENCIÓN

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H373 Puede provocar daños en la circulación sanguínea tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/ el aerosol.
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
P391 Recoger el vertido.
P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

7. Presentación:

Envase de 1 L, 5 L

8. Aplicaciones autorizadas, dosis y modo de empleo:

USO	DOSIS	Nº APLIC.	INTERVALOS	VOL. CALDO	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Cultivo al aire libre - Aplicar en pulverización normal con tractor					
Mandarino (incluido clementino e híbridos)	0,1 - 0,12 l/hl	1	-	1000 - 3000 l/ha	No superar la dosis máxima por aplicación de 3 l/ha. Aplicar durante BBCH 51-60 y BBCH 70-89.
Manzano	0,12 - 0,18 l/hl	1	-	1000 - 1500 l/ha	No superar la dosis máxima por aplicación de 1,8 l/ha. Aplicar durante BBCH 35-60 y BBCH 70-89.
Melocotonero	0,12 - 0,18 l/hl	1	-	1000 - 1500 l/ha	No superar la dosis máxima por aplicación de 1,8 l/ha. Aplicar durante BBCH 35-60 y BBCH 70-89.
Naranja	0,1 - 0,12 l/hl	1	-	1000 - 3000 l/ha	No superar la dosis máxima por aplicación de 3 l/ha. Aplicar durante BBCH 51-60 y BBCH 70-89.
Peral	0,12 - 0,18 l/hl	1	-	1000 - 1500 l/ha	No superar la dosis máxima por aplicación de 1,8 l/ha. Aplicar durante BBCH 35-60 y BBCH 70-89.
Frutales de cáscara *	0,12 - 0,18 l/hl	1	-	1000 - 1500 l/ha	Uso menor autorizado por procedimiento nacional. No superar la dosis máxima por aplicación de 1,8 l/ha. Aplicar durante BBCH 35-60 y BBCH 70-89.
Cultivo al aire libre - Aplicar en pulverización foliar					
Berenjena	0,1 - 0,12 l/hl	2	10 - 14 días	1000 l/ha	Uso menor por jerarquía de cultivos. No superar la dosis máxima por aplicación de 1,2 l/ha. Aplicar durante BBCH 50-60 y BBCH 70-80.
Calabacín	1 - 1,2 l/ha	1 - 2	14 días	400 - 1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 50-60 y BBCH 70-80.
Calabaza	1 - 1,2 l/ha	1 - 2	14 días	400 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía de cultivos. Aplicar durante BBCH 50-60 y BBCH 70-80.
Fresal	1 - 1,2 l/ha	1	-	1000 - 1200 l/ha	Aplicar durante BBCH 50-60 y BBCH 70-89.
Melón	1 - 1,2 l/ha	1 - 2	14 días	400 - 1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 50-60 y BBCH 70-80.
Pepinillo	1 - 1,2 l/ha	1 - 2	14 días	400 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía de cultivos. Aplicar durante BBCH 50-60 y BBCH 70-80.
Pepino	1 - 1,2 l/ha	1 - 2	14 días	400 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía de cultivos. Aplicar durante BBCH 50-60 y BBCH 70-80.
Sandía	1 - 1,2 l/ha	1 - 2	14 días	400 - 1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 50-60 y BBCH 70-80.
Tomate	0,1 - 0,12 l/hl	2	10 - 14 días	1000 l/ha	No superar la dosis máxima por aplicación de 1,2 l/ha. Aplicar durante BBCH 50-60 y BBCH 70-80.
Cultivo en invernadero - Aplicar en pulverización manual con lanza o pistola, o manual con mochila					
Berenjena	1 l/ha	1	-	1000 l/ha	Uso menor por jerarquía de cultivos. Aplicar durante BBCH 50-80.
Calabacín	1 - 1,2 l/ha	1 - 2	14 días	400 - 1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 50-80.
Fresal	1 - 1,2 l/ha	1	-	1000 - 1200 l/ha	Aplicar durante BBCH 50-89.
Pepinillo	1 - 1,2 l/ha	1 - 2	14 días	400 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía de cultivos. La dosis máxima por aplicación es 1 l/ha con 2 aplicaciones. En aplicación única, la dosis es 1-1,2 l/ha. Aplicar durante BBCH 50-80.
Pepino	1 - 1,2 l/ha	1 - 2	14 días	400 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía de cultivos. La dosis máxima por aplicación es 1 l/ha con 2 aplicaciones. En aplicación única, la dosis es 1-1,2 l/ha. Aplicar durante BBCH 50-80.
Pimiento	1 - 1,2 l/ha	1	-	400 - 1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 50-89.
Tomate	1 l/ha	1	-	1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 50-80.

(*) De acuerdo con el artículo 51.5 del Reglamento 1107/2009, el usuario del producto asumirá cualquier fallo de eficacia o falta de selectividad del producto en los cultivos menores autorizados.

PLAGA: Ácaros tetránquidos;

PLAZOS DE SEGURIDAD

(Protección del consumidor)

- Mandarino (incluido clementino e híbridos), naranjo: **28 días**
- Berenjena, Calabacín, Calabaza, Fresal, Melón, Pepinillo, Pepino, Pimiento, Sandía, Tomate: **3 días**
- Frutales de cáscara: **14 días**
- Manzano, melocotonero (incluido nectarino), peral: **30 días**

9. Condiciones de almacenamiento:

Almacenar a temperaturas de entre 5 y 35 °C.

10. Gestión del envase

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno. Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador). PROHIBIDO REUTILIZAR EL ENVASE.

Clasificación del modo de acción de las sustancias activas según IRAC:

GRUPO	20B	INSECTICIDA
-------	-----	-------------

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.