

FICHA TÉCNICA

1. Producto:

Nombre: **AMID-THIN®**

2. Número de registro:

16.170

Denominación común:

CLERTHIN

3. Composición:

ANA-AMIDA 8,2% p/p (82 g/kg)

4. Formulación:

Polvo mojable (WP)

5. Descripción:

AMID-THIN® es un fitorregulador para el aclareo químico del manzano. Induce la formación de una zona de abscisión en el pedúnculo del fruto. AMID-THIN® permite obtener frutos de mayor calibre y más calidad. Reduce la vecería del cultivo porque elimina los frutos pequeños antes de que estos perjudiquen la inducción floral del año siguiente.

6. Clasificación toxicológica:



ATENCIÓN

H361d Se sospecha que daña el feto. / H319 Provoca irritación ocular grave. / H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. / P201+ P202 Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. / P260 No respirar la niebla de pulverización. / P280 Llevar guantes y prendas de protección. / P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. / P273 Evitar su liberación al medio ambiente. / P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.
El preparado no se usará en combinación con otros productos.

7. Presentación:

Envases de 1 Kg

8. Aplicaciones autorizadas, dosis y modo de empleo:

AMID-THIN® se aplicará mediante tractor y en pulverización abundante a alta presión, insistiendo especialmente en las partes superiores del árbol, que son las más difíciles de aclareo.

CULTIVO	DOSIS (g/Hl)	Nº APLICACIONES	INTERVALOS	VOL. CALDO (l/ha)	PLAZO DE SEGURIDAD (días)
Manzano	100	1	-	1.000	90

Para obtener los mejores resultados, aplicar AMID-THIN® a partir de la caída de pétalos, aproximadamente 10 días después de la plena floración (BBCH 65-71) y preferentemente al atardecer, en condiciones de humedad relativa elevada, de forma que el caldo se seque lentamente sobre el follaje evitando la rápida vaporación de las gotas de pulverización.

9. Precauciones de uso:

Evitar aplicaciones tardías. Tratamientos 20 días después de la plena floración pueden dar resultados insuficientes. No tratar con tiempo frío, lluvioso o demasiado cálido.

Tratar los árboles en perfecto estado sanitario y de nutrición. No mezclar con ningún otro producto fitosanitario. Preparar la cantidad de caldo necesaria para la aplicación y tratar cuanto antes.

La acción de AMID-THIN® depende de varios factores como: variedad, vigor, importancia y calidad de los polinizadores, condiciones climáticas en el momento de la fecundación, condiciones meteorológicas (antes, durante y después del tratamiento), estado de los árboles y sus antecedentes, nivel de reservas, etc. El fruticultor deberá valorar aquellos aspectos de su plantación que pueden influir sobre el resultado final. Respetando las condiciones de empleo indicadas, se reduce al mínimo el riesgo de sobreaclareo.

Después del tratamiento efectuar un cuidadoso lavado de los aparatos con abundante agua, haciéndola circular por bomba, gomas y boquillas.

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.