

WELGRO[®]

41+MICRO



PESSO NETTO:

10 kg



**CONCIME CE. CONCIME NPK 5-5-41 CON BORO (B), FERRO (FE),
MANGANESO (Mn), MOLIBDENO (Mo) E ZINCO (Zn)
OTTENUTO PER MISCELAZIONE**



PERICOLO

H318 Provoca gravi lesioni oculari. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103 Leggere l'etichetta prima dell'uso. P280 Indossare guanti. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un medico, un CENTRO ANTIVELENI. P401 Conservare lontano da alimenti e bevande, compresi quelli per animali.

WELGRO[®] 41+MICRO è un concime altamente concentrato e completamente solubile in acqua impiegato per applicazioni fogliari. La sua principale caratteristica è l'elevato contenuto di potassio (41% di K₂O), elemento di grande importanza nella regolazione di vari processi fisiologici vitali (assorbimento radicale e fogliare, apertura e chiusura degli stomi, ecc.) che facilita la maturazione dei frutti.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

WELGRO[®] 41+MICRO si applica alla dose di 100-300 g/hl su fruttiferi in generale, vite, agrumi, Kiwi, olivo, fragola, piccoli frutti e colture orticole tutte in particolare si raccomandano i seguenti dosaggi su:

Pomacee (melo e pero): Effettuare i trattamenti a partire da ingrossamento del frutto fino a raccolta al dosaggio di 1,5-2,5 Kg/ha.

Drupacee (pesco, nettarino, albicocco, susino, ciliegio, mandorlo, etc.): Si consiglia di iniziare il trattamento da ingrossamento del frutto fino alla raccolta al dosaggio di 1,5-2,5 kg/ha.

Kiwi: Trattare da ingrossamento frutto fino alla raccolta al dosaggio di 1-3 kg/ha.

Vite (da vino e da tavola): Applicare il prodotto dalla chiusura del grappolo a sino alla maturazione alla dose di 2-3 kg/ha.

Olivo: Trattare dopo l'inverimento del nocciolo e sino a maturazione al dosaggio di 0,5-1 Kg/hl.

Pomodoro: Effettuare 1-2 trattamenti dopo la comparsa di tutte le infiorescenze alla dose di 150-250 g/hl. In fertirrigazione si può applicare durante la formazione dei frutti e la loro maturazione alla dose di 3-5 Kg/ha settimanalmente.

Patata: Intervenire all'inizio della formazione dei tuberi e 15-21 giorni dopo alla dose di 2-2,5 Kg/ha.

AVVERTENZE: **WELGRO[®] 41+MICRO** è miscibile con i più comuni fitofarmaci impiegati sulle colture per le quali se ne consiglia l'impiego.

**DA UTILIZZARE SOLTANTO IN CASO DI BISOGNO RICONOSCIUTO.
NON SUPERARE LE DOSE APPROPRIATE.**



COMPOSIZIONE:

Azoto (N) totale	5% p/p
Azoto (N) nitrico	5% p/p
Anidride fosforica (P ₂ O ₅) solubile in citrato ammonico neutro e in acqua	5% p/p
Anidride fosforica (P ₂ O ₅) solubile in acqua	5% p/p
Óssido di potassio (K ₂ O) solubile in acqua	41% p/p
Boro (B) solubile in acqua	0,02% p/p
Ferro (Fe) solubile in acqua	0,13% p/p
Ferro (Fe) chelato con EDTA	0,13% p/p
Manganese (Mn) solubile in acqua	0,05% p/p
Manganese (Mn) chelato con EDTA	0,05% p/p
Molibdenu (Mo) solubile in acqua	0,005% p/p
Zinco (Zn) solubile in acqua	0,06% p/p
Zinco (Zn) chelato con EDTA	0,06% p/p

Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 2-6.

Partita n. e data di fabbricazione:
Vedi su questa confezione

Distribuito da:



COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.

Viladomat, 321, 5^o - 08029 Barcelona (España)

Tel. +34 93 495 25 00 - E-mail: masso@cqqmasso.com - www.massooagro.com

Succursale ITALIA:

V.le Fulvio Testi, 59 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel. +39 02 61868218 - Fax +39 02 61868217 - E-mail: info.italia@cqqmasso.com