

278 x 140 mm



INSETTICIDA-ACARICIDA

PROBEL 1,8

COMPOSIZIONE:

ABAMECTINA PURA g. 1,89 (18 g/l), coformulanti: q.b. a g. 100

Contiene nafta solvente (petrolio), aromatica pesante.

MECCANISMO D'AZIONE IRAC 6

Registrazione Ministero della Salute n. 16921 del 06/02/2017.

INSETTICIDA-ACARICIDA, concentrato emulsionabile ad azione translaminare, efficace per ingestione e contatto diretto, per l'impiego in serre permanenti sulle colture pomodoro, melanzana, melone, zucca, cocomero, cetriolo, cetriolino, zucchini, fragola, floreali, ornamentali.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 08/05/2023 e modificata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 01/05/2026.

Distribuito da:



COMERCIAL QUÍMICA MASSO, S.A. - Succursale ITALIA:
Viale Marelli, 132 - 20099 Sesto San Giovanni (Milano)
Tel. +39 02 0996 6107 - E-mail: info.italia@cquimasso.com - www.massagro.com



CONTENUTO NETTO:
1 litro

PROBEL 1,8 INSETTICIDA-ACARICIDA

PARTITA N.: Vedi corpo della confezione

COMPOSIZIONE: ABAMECTINA PURA g. 1,89 (18 g/l), coformulanti: q.b. a g. 100
Contiene nafta solvente (petrolio), aromatica pesante. MECCANISMO D'AZIONE IRAC 6.

Registrazione Ministero della Salute n. 16921 del 06/02/2017

CONTENUTO NETTO:

1 litro



PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO: H302 Nocivo se ingerito. H318 Provoca gravi lesioni oculari. H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. H360DF Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità. H373 Può provocare danni agli organi (sistema nervoso) in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: PREVENZIONE: P201 Procurarsi le istruzioni prima dell'uso. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso. **REAZIONE:** P301+P310+P331 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. NON provocare il vomito. P305+P351+P338+P310 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P308+P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. **SMALTIMENTO:** P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH066 L'esposizione ripetuta può causare secchezza e screpolature della pelle. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

UFI: UXCO-8072-T00C-S9GV



PROBELTE S.A.U., C/ Ulea, 22 - P.I. La Polvorista
30500 Molina de Segura (Murcia) Spagna - Tel. +34 968 307 250

Distribuito da: **COMERCIAL QUÍMICA MASSO, S.A., Succ. ITALIA:**
Viale Marelli, 132 - 20099 Sesto San Giovanni (Milano) Tel: +39 02 0996 6107

Stabilimento di produzione:

PROBELTE S.A.U.
Calle Ulea, 22 - P.I. La Polvorista
30500 Molina de Segura (Murcia) Spagna

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Prima di accedere all'area trattata è opportuno attendere che la vegetazione sia completamente asciutta. Eventuali lavorazioni agricole, da effettuarsi in tempi successivi al trattamento e prima che sia trascorso un periodo di tempo adeguato, debbono essere effettuate seguendo alcune norme precauzionali: indossare indumenti protettivi e guanti adatti al fine di evitare il contatto diretto con la pelle da parte della vegetazione precedentemente trattata. Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto usare guanti e tuta da lavoro completa. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Pericoloso per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura. Non utilizzare in presenza di api.

Rispettare un periodo di 4 giorni prima di permettere il rientro degli insetti impollinatori ed i 14 giorni per l'introduzione di insetti utili.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: TERAPIA: non si conoscono antidoti, decontaminazione tramite carbone attivato seguita da terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleini.

CARATTERISTICHE GENERALI: PROBEL 1,8 è un insetticida-acaricida contenente abamectina, principio attivo efficace nei confronti di tutte le forme mobili di insetti ed acari. Per raggiungere la massima mortalità dei fitofagi possono essere necessari anche 3-5 giorni in seguito all'intervento con **PROBEL 1,8**. Dopo l'applicazione gli insetti e gli acari riducono sensibilmente l'alimentazione, quindi il danno procurato in questa epoca è minimo.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

POMODORO (in serre permanenti):

- Ragnetti rossi (*Tetranychus urticae*, *Polyphagotarsonemus latus*), Eriofide (*Aculus lycopersici*) 50 - 100 ml/ha (0,15 - 1,0 l/ha) alla comparsa delle prime forme mobili.

- Tignola del pomodoro (*Tuta absoluta*) 100 ml/ha (1,0 l/ha) alla comparsa delle prime mine.

- Minatrici fogliari (*Liriomyza spp.*) 50 - 100 ml/ha (0,15 - 1,0 l/ha) alla comparsa delle prime punture di ovodeposizione.

Effettuare 1 - 3 applicazioni ad intervalli di 7 giorni, utilizzando 300 - 1000 litri di acqua per ettaro.

MELANZANA (in serre permanenti):

- Raghetto rosso (*Tetranychus urticae*) 50 - 80 ml/ha (0,15 - 0,8 l/ha) alla comparsa delle prime forme mobili.

Effettuare 1 - 3 applicazioni ad intervalli di 7 giorni impiegando 300 - 1000 litri di acqua per ettaro.

MELONE, ZUCCA, COCOMERO, CETRIOLO, CETRIOLINO, ZUCCHINO (in serre permanenti):

- Raghetto rosso (*Tetranychus urticae*) 50 - 100 ml/ha (0,15 - 1,0 l/ha) alla comparsa delle prime forme mobili.

- Minatrici fogliari (*Liriomyza spp.*) 50 - 100 ml/ha (0,15 - 1,0 l/ha) alla comparsa delle prime punture di ovodeposizione.

Effettuare 1 - 2 applicazioni ad intervalli di 7 giorni impiegando 300 - 1000 litri di acqua per ettaro.

FRAGOLA (in serre permanenti):

- Ragnetti rossi e gialli (*Tetranychus urticae*, *Phytonemus pallidus*) 50 - 100 ml/ha (0,15 - 1,0 l/ha) alla comparsa delle prime forme mobili.

- Minatrici fogliari (*Liriomyza spp.*) 50 - 100 ml/ha (0,15 - 1,0 l/ha) alla comparsa delle prime punture di ovodeposizione.

Effettuare 1 - 2 applicazioni ad intervalli di 7 giorni impiegando 300 - 1000 litri di acqua per ettaro.

FLOREALI ED ORNAMENTALI (in serre permanenti):

- Ragnetti rossi (*Tetranychus urticae*) 50 - 100 ml/ha (0,15 - 1,0 l/ha) alla comparsa delle prime forme mobili.

Effettuare 1 - 3 applicazioni ad intervalli di 15 giorni impiegando 300 - 1000 litri di acqua per ha.

Per trattamenti su melone, cocomero, zucca, cetriolo, cetriolino, zucchini e fragola non trattare nel periodo invernale compreso tra Novembre e Febbraio.

COMPATIBILITÀ: AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZE AGRONOMICHE: Dato il rischio intrinseco di sviluppo di resistenza a qualsiasi prodotto antiparassitario da parte dei parassiti, si raccomanda di usare il prodotto secondo un programma adeguato di prevenzione della resistenza, che comprenda l'impiego di prodotti con diverse modalità di azione. Attuare una adeguata rotazione con prodotti acaricidi ed insetticidi efficaci. Allo scopo di controllare le possibili cause di resistenza non applicare il prodotto più di due volte in successione. Non contaminare le acque con la pulitura delle attrezzature o lo smaltimento dei rifiuti. Sospendere i trattamenti prima della raccolta: 3 giorni per pomodoro, melanzana, cetriolo, cetriolino, zucchini, melone, zucca, cocomero, fragola.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA. / DA NON VENDERSI SFUSO. / IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. / NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. / OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. / IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

6003064 - V02.01 V8