270 x 140 mm

MASSÓ AGRO DEPARTMENT

DISHA


INSETTICIDA
CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)

Meccanismo d'azione: gruppo 3A (IRAC)

DISHA

COMPOSIZIONE: DELTAMETRINA PURA 2,81% (=25 g/l)
COFORMULANTI Q.B. A ... g 100
CONTIENE: NAFTA SOLVENTE (PETROLIO) AROMATICA LEGGERA

Autorizzazione Ministero della Salute n. 15411 del 18/05/2012.



AVVERTENZA: PERICOLO

Indicazioni di pericolo: H226 Liquido e vapori infiammabili. H302 Nocivo se ingerito. H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H318 Provoca gravi lesioni oculari. H332 Nocivo se inalato. H335 Può irritare le vie respiratorie. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici. H410 Altamente tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **Consigli di prudenza:** P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. Non fumare. P233 Tenere il recipiente ben chiuso. P240 Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente. P241 Utilizzare impianti di ventilazione a prova di esplosione. P242 Utilizzare solo utensili antiscintillamento. P243 Prendere precauzioni contro le cariche elettrostatiche. P261 Evitare di respirare i vapori/aerosol. P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/ proteggere gli occhi/il viso. P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico. P301+P312 IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un centro antiveleni o un medico. P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P312 In caso di malessere contattare un centro antiveleni o un medico. P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. P330 Sciacquare la bocca. P331 NON provocare il vomito. P370+P378 In caso di incendio estinguere con schiuma chimica. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso in luogo ben ventilato. P403+P235 Conservare in luogo fresco e ben ventilato. P405 Conservare sotto chiave. P501 Smaltire il prodotto ed il recipiente secondo le disposizioni locali.
Informazioni supplementari: EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolatura della pelle. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni d'uso.

UFI CODE: EHXW-F8VK-T00S-JP83

CONTENUTO NETTO:
1 litro

Partita n: Vedere confezione

Sharda Cropchem España S.L., Edificio Atalayas business Center, Carril Condomina, 3 - 12th floor - 30006 Murcia (Spagna) - Tel. +39 02 3604 2884
Stabilimento di produzione e confezionamento: **LUQSA** Alfarras, s/n 25173 SUDANELL (Lleida) Spagna
Distribuito da: **COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A. - Succursale ITALIA**, Viale Marelli, 192 - 20099 Sesto San Giovanni (Milano) Tel: +39 02 0996 6107

BOTTIGLIA	TAPPO	ETICHETTA
7 COEX/EVOH	PP 5 HDPE 2 COEX 7	PE7/ LDPE 4
PLASTICA		

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A. - Madomat, 321, 5º - 08029 Barcelona (España)
Tel. +34 93 495 25 00 - E-mail: masso@cmasso.com - www.massoagro.com

DISHA — INSETTICIDA - CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 30 metri per colture arboree, 20 metri per vite, 10 metri per tutte le colture. Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da zona non coltivata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Deltametrina: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. **Sintomi a carico del SNC:** tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. **Terapia:** sintomatica e di rianimazione. Diluenti (idrocarburi) possono provocare bromcopolmoniti chimiche, aritmie cardiache. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE: DISHA è un insetticida che agisce per contatto e ingestione, con ampio spettro di attività contro gli insetti nocivi. Dotato di una rapida azione iniziale, consente una protezione dei vegetali sufficientemente duratura con grande sicurezza d'impiego.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: Frutticoltura (melo, pero, pesco, albicocco): contro psilla 0.75 L/ha per melo, pesco, albicocco e 0.70 L/ha per pero, afide verde del melo, afide del pesco (*Myzus* spp., *Hyalopterus* spp., *Brachycaudus persicae*) L/ha 0.3-0.5, cocciniglia di S. Josè 0.5-0.75 L/ha (in trattamenti estivi contro neanidi mobili).Contro carpocapsa 0.30 L/ha, cidia e anarsia 0.50-0.70 L/ha, capua, cacoecia ed altri tortricidi 0.30-0.50 L/ha, micro lepidotteri del melo e del pero 0.30-0.50 L/ha. Contro antonomo, maggiolino, tentredini, tripidi, cecidomidi e mosca della frutta 0.30-0.50 L/ha. Effettuare al massimo 2 applicazioni a distanza di 14 gg. **Viticoltura:** contro tignole 0,40-0,60 L/ha, piralide, nottue, cicaline, afidi, sigaraio 0,30-0,50 L/ha. Effettuare al massimo 2 applicazioni a distanza di 14 gg. **Olivicoltura:** contro Saissetia 0,40-0,60 L/ha, tignola (*Prays oleae*) e tripide 0,50 L/ha, mosca delle olive 0,50 L/ha, in trattamento preventivo. Effettuare al massimo 2 applicazioni a distanza di 14 gg. **Orticoltura (lattughe ed insalate (escluso la scarola e le baby leaf di cicoria, spinacio e bietola da foglia), cipolla, porro, cetrioli, melanzane, pomodori, peperoni, piselli, fagioli, fagiolini, fave, carote, patate – solo uso in campo, fragole):** contro dorifora, altiche, cavolaia, nottue, tripidi e tentredini 0.30 L/ha, afidi, aleurodidi, cimici, piralide, cassidè, tignola, mosca e depressaria 0.50 L/ha. Effettuare al massimo 2 applicazioni a distanza di 14 gg (7 gg in serra per tutte le colture eccetto fragola e fagioli/fagiolini). **Cereali: Mais (trattamenti primaverili-estivi):** contro nottue e tripidi 0,30 L/ha, afidi, cimici, piralide e diabrotica 0,50 L/ha. Effettuare al massimo 2 applicazioni a distanza di 14 gg. **Frumento (trattamenti primaverili-estivi):** contro nottue, tripidi e afidi 0,30 L/ha, cimici 0,50 L/ha. **Frumento, orzo (trattamenti autunnali):** contro afidi vettori del nanismo giallo 0,3-0,5 L/ha, allo stadio di 1-3 foglie, ripetendo, se necessario, il trattamento dopo 15 giorni circa. Effettuare al massimo 2 applicazioni a distanza di 14 gg. **Colza:** contro altiche e meligete 0,30 L/ha, afidi e punteruoli 0,50 L/ha. Effettuare al massimo 2 applicazioni a distanza di 14 gg. **Tabacco:** contro nottue, afidi, tripidi, pulce (*Epitrix*) 0,3-0,5 L/ha. Effettuare al massimo 2 applicazioni a distanza di 14 gg. **Cotone (solo per uso tessile):** contro nottue, piralide, tignola, cicalina, tripidi, lygus 0,30 L/ha. Effettuare al massimo 2 applicazioni a distanza di 14 gg. **Medicai:** contro cavallette 0,50 L/ha, intervenendo sui nuovi ricacci, 5-10 giorni dopo lo sfalcio. **La necessità del trattamento deve venire previamente constatata dall'Autorità regionale preposta ed il trattamento deve avvenire sotto il controllo della stessa. Effettuare al massimo 2 applicazioni a distanza di 14 gg. Floricoltura (in campo o in serra):** contro afidi, aleurodidi, tripidi, cetonie, maggiolino 0,50 L/ha, tortricidi dei garofani (*Bega e Epcoristode*) 0,50-1,0 L/ha. Effettuare al massimo 2 applicazioni a distanza di 14 gg. **Vivai e colture ornamentali in campo o in serra:** contro afidi, cimice del platano (*Corythuca*), larve di lepidotteri, maggiolino 0,50 L/ha. Effettuare al massimo 2 applicazioni a distanza di 14 gg (di 7 gg in serra). **Pioppo: in vivao:** contro gemmaiola e tarlo vespa 0,50 L/ha, criptorrinco 1.0 L/ha. Effettuare al massimo 2 applicazioni a distanza di 14 gg. **In piantagione:** contro criptorrinco 1.0 L/ha, saperda 2 L/ha, crisomelidi defogliatori (*crisomela, crisomelidi minori* e *stilp- notiae*) 0,30-0,50 L/ha.

Diluire la dose indicata di **DISHA** in poca acqua, versare nel serbatoio e portare a volume, mantenendo l'agitazione. Le dosi riportate si riferiscono a trattamenti a volume normale. Per trattamento a volume ridotto, aumentare la concentrazione in proporzione alla riduzione del volume di acqua, così da mantenere la stessa dose di principio attivo per ettaro.

DISHA agisce per contatto ed ingestione, occorre pertanto eseguire un trattamento molto accurato badando che la bagnatura sia la più uniforme possibile su tutta la vegetazione. In caso di vegetali di difficile bagnatura si consiglia l'aggiunta di Bagnante Adesivo Emelfa (ml 10-20 per 100 litri di miscela). Per assicurare la migliore efficacia del trattamento intervenire precocemente prima che il parassita penetri nel vegetale o provochi accartocciamento delle foglie.

COMPATIBILITA': DISHA è miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione neutra. Per la miscela con fungicidi in polvere bagnabile è necessario aggiungere la dose di DISHA preventivamente diluita in acqua alla poltiglia fungicida già preparata, mantenendo l'agitazione. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA' Il prodotto è nocivo per gli insetti utili. Nocivo per le api, non trattare durante la fioritura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU COLZA E FRUMENTO, 15 GIORNI SU ERBA MEDICA, 14 GIORNI SU LATTUGA IN SERRA, 7 GIORNI SU PERO, OLIVO, PORRO, LATTUGA IN CAMPO E PATATA, 3 GIORNI SULLE ALTRE COLTURE.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare i rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.L.vo n. 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

8 904150 024898

Etichetta adeguata ai sensi del D.D. emesso in data 6 dicembre 2024 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. N. 55/2012, con validità dal 20 luglio 2026.

V.6.1

www.knowledgro.com