149 x 149 mm

MASSÓ AGRO DEPARTMENT

CYCLO MAX SC

FUNGICIDA ANTIPERONOSPORICO SISTEMICO

CYCLO MAX SC

FUNGICIDA ANTIPERONOSPORICO SISTEMICO PER VITE, PATATA E POMODORO

SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)
M-Metalaxil FRAC 4 gruppo A1 (RNA polimerasi I)
Rame sotto forma di idrossido FRAC M1 (attività di contatto multisito)
Registrazione Ministero della Salute n° 17373 del 19/12/2018

COMPOSIZIONE:

M-Metalaxil puro	g.	2,26 (= 28,5 g/l)
Rame metallo (da rame idrossido)	g.	17,06 (=215,0 g/l)
Coformulanti q.b. a	g.	100

ALBAUGH TKI d.o.o. Grajski trg 21, SI-2327 RAČE, Slovenia
Tel.: +386 2 60 90 211 - www.albaugh.eu
Informazioni Tecniche: 800 986 776
Informazioni di emergenza CARECHEM (24h): +44 (0) 1235 239 670
(chiamate gestite in lingua italiana)

Stabilimenti di produzione:
Albaugh TKI d.o.o. Grajski Trg 21, SI-2327 - Rače, Slovenia

Distribuito da:
COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ S.A. Succ. ITALIA: - Viale Marelli, 1[illegible]
20099 Sesto San Giovanni (MI) - Tel. 02 0996 6107

CONTENUTO NETTO: 10 litri

INDICAZIONI DI PERICOLO: H302 Nocivo se ingerito. H318 Provoca grave lesioni oculari. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso. P301+P312 In caso di ingestione: contattare un centro antiveleni o un medico. P305+P351+P338+P310 In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriusc[illegible]. P[illegible] Smaltire il prodotto/recipie[illegible] conformità [illegible] regolamentazione nazi[illegible]e.
INFORMAZIONI SUPP[illegible]ENTARI S[illegible]ERICOLI: [illegible]401 Per evita[illegible]e rischi per la [illegible]ute umana [illegible]per l'ambi[illegible]e, seguire [illegible] istruzioni per [illegible]so. EUH 2[illegible] Contiene 1,2-benz[illegible]thiazol-3(2H)on[illegible]. Può provo[illegible]are una [illegible]zione [illegible]ergica.

UF[illegible]G0[illegible]096-000[illegible]MDF6

[illegible]artita n[illegible]
[illegible]di timbro sulla confezione

PERICOLO

COMERCIAL QUÍ[illegible]A [illegible]Ó, S.[illegible]
Vilado[illegible], 321, 5[illegible] [illegible]8029 [illegible]elo[illegible] España
Tel. 9[illegible]25 00 - [illegible]ail: ma[illegible]@c[illegible]asso.com - www.massoagro.com

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 19 Febbraio 2025 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 02/08/2025.

V.1

TAPPO	SIGILLO BOTTIGLIA	FLACONE
C/PP81	C/ALU 90	HDPE 2

149 x 149 mm

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Per le applicazioni con trattore l'operatore deve indossare guanti, tuta e scarpe robuste durante l'a[illegible]zione. Le colture trattate non devono essere re-immesse prima che le superfici fogliari siano completamente asciutte. I lavoratori devono utilizzare guanti [illegible]atti [illegible]nte mix/carico. Utilizzo limitato ad applicatori professionisti e agricoltori qualificati. Il contenitore vuoto è un rifiuto pericoloso, deve essere smal[illegible]erso un[illegible]ecifico programma di raccolta in conformità con le normative vigenti. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pul[illegible] materia[illegible]'applicaz[illegible] in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle [illegible]de. Per p[illegible]eggere g[illegible]ganismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali per le applicazioni [illegible], [illegible]odor[illegible] patata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi [illegible]uti. Rimu[illegible]e le [illegible]i a conta[illegible]se è agevole farlo.Togliere immediatamente gli abiti macchiati. Lavare la pelle con abbondante acqua e sapone [illegible]ofin[illegible]. Non somm[illegible]strare [illegible]una sostanza per via orale. In caso di ingestione, NON indurre il vomito. Mantenere il paziente riposato e mantenere la tem[illegible]ratura corpore[illegible]. Portare la [illegible]sona intossicata in un ospedale e, se possibile, portare l'etichetta o l'imballaggio NON LASCIARE SOLO VITTIMA IN OGNI CASO. **Avver[illegible]za: consultare [illegible] Centro [illegible]tiveleni.**

CARATTERISTICHE: CYCLO MAX SC è un fungicida sistemico e di contatto a base di M[illegible]etalaxyl e [illegible]e sottoforma di idrossido a triplice azione preventiva, curativa e antisporulante. M-Metalaxyl agisce bloccando la crescita [illegible]micel[illegible]ngino e la sp[illegible]zione. [illegible]ssorbe rapidamente attraverso le foglie e viene traslocato verso le parti in attiva crescita della coltura (traslocazio[illegible] acr[illegible]ta). Tale t[illegible]ocazione risult[illegible]ua e graduale garantendo così una protezione anche sulla nuova vegetazione in via di formazione. Il Rame id[illegible] garan[illegible]e una spic[illegible] azio[illegible] di protezione preventiva sulla vegetazione già sviluppata, oltre che una azione collaterale battericida. Grazie alla magg[illegible]re att[illegible] rispetto [illegible] altri Sali d[illegible]me, l'idrossido garantisce una più rapida azione antiperonosporica potenziando l'effetto del M-Metalaxyl. La formulazion[illegible]sione [illegible]centrata g[illegible]ntisce [illegible] migliore solubilità del prodotto e una più spiccata attività coprente del rame in virtù della ottimale micronizzazione dell[illegible]articelle [illegible]rado d[illegible]igliorare la copertura della superficie fogliare.

DOSI E MODALIT[illegible]IMPIEGO: [illegible] prodotto [illegible]piega [illegible]presenza delle condizioni predisponenti la malattia in genere nelle fasi centrali dello sviluppo della coltura. La traslocazion[illegible]ropeta [illegible] pro[illegible]o consent[illegible] che la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa nell'intervallo che intercorre tra un trattamento ed un altro. La presenza [illegible]rame id[illegible]do o[illegible]ttività [illegible]rale nei confronti delle batteriosi. **VITE (da Vino e da Tavola):** Contro Peronospora (*Plasmopara viticola*): impiegare [illegible]/ha di pro[illegible]to ese[illegible]ndo i t[illegible]enti [illegible] intervalli di 12-14 giorni a partire dalla fase di allegagione a quella di invaiatura (BBCH 71-83). Per la distribuzione del pr[illegible]to im[illegible]egare un [illegible]tativo di acqua variabile da 500 l/ha fino ad un massimo di 1000 l/ha e comunque sufficiente ad assicurare la buona copertura della vegetazi[illegible]. M[illegible]enere sempre il qua[illegible]vo di prodotto per ettaro indipendentemente dai volumi di acqua utilizzati. Effettuare un massimo di 2 applicazioni all'anno. **[illegible]TATA:** [illegible] Peronospora (*Phytophtora infestans*) impiegare 3,5 litri/ha di prodotto iniziando le applicazioni durante la fase di allungamento dello stelo principale [illegible]uando la vegetazione copre il 60% della superficie esposta del terreno) e fino alla fine dell'accrescimento dei tuberi, eseguendo i trattamenti ad intervalli [illegible]orni (BBCH 36-81). Per la distribuzione del prodotto impiegare un quantitativo di acqua fra 500 e 1000 litri/ha e comunque sufficiente ad assicurare la buona copertura della vegetazione mantenendo sempre il quantitativo di prodotto per ettaro indipendentemente dai volumi di acqua utilizzati. Effettuare un massimo di 3 applicazioni all'anno. **POMODORO E MELANZANA (In pieno campo e in serra):** Contro Peronospora (*Phytophtora infestans*) impiegare 3,5 litri/ha di prodotto iniziando le applicazioni a partire dalla pre-fioritura e fino all'inizio della maturazione dei frutti, eseguendo i trattamenti ad intervalli di 7-10 giorni (BBCH 29-81). Per la distribuzione del prodotto impiegare un quantitativo di acqua fra 500 e 1000 litri/ha e comunque sufficiente ad assicurare la buona copertura della vegetazione mantenendo sempre il quantitativo di prodotto per ettaro indipendentemente dai volumi di acqua utilizzati. Effettuare un massimo di 3 applicazioni all'anno.
Si consiglia di utilizzare il prodotto in un programma di gestione del rischio di insorgenza di resistenza. Si consiglia l'utilizzo di fenilammidi (gruppo FRAC: 4) su base preventiva. Si raccomanda di non superare 4 applicazioni annuali di prodotti a base di fenilammidi. Attenersi strettamente alle indicazioni di etichetta per quanto riguarda modalità, dosi ed intervalli di applicazione.
Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo medio applicato di 4 kg di rame per ettaro all'anno.

COMPATIBILITÀ: AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con oli minerali e polisolfuri.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU VITE, 21 GIORNI SU PATATA, 10 GIORNI SU POMODORO E MELANZANA IN PIENO CAMPO E 3 GIORNI SU POMODORO E MELANZANA IN SERRA.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

8 424084 040646

MM-11/25

V.2

www.massoagro.com