

270 x 145 mm



PRIAM® TOP

FUNGICIDA SISTEMICO

PRIAM® TOP FUNGICIDA SISTEMICO

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:
Tebuconazolo puro, 250 g/l; Coformulanti q.b. a g 100

Autorizzazione del Ministero della Salute n. 16540 del 7/10/2016

CONTENUTO NETTO: 1 litro

INDICAZIONI DI PERICOLO: H318 Provoca gravi lesioni oculari. H335 Può irritare le vie respiratorie. H361D Sospettato di nuocere al feto. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana evitare l'uso in campo, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P202 Non usare prima di leggere le avvertenze. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P313: In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

UFI: YEUV-D851-CUET-KTKJ

HELM HELM AG - Nordkanalstrasse 28 - D-20097 Hamburg - Tel. 0049 4103 23750

Stabilimenti di Produzione:

Agropak - Spółka Jawna - ul. Darwin 1d, 43-600 Wroclaw, Polonia
Schirm GmbH - Geschwister Scholch 17, D-39277 Schönebeck, Germania



Distribuito da:
COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.
Viale Marelli, 132- 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. +39 02 0996 6107
E-mail: info.italia@cqmasso.com



PERICOLO

PRIAM® TOP

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non rientrare nelle aree trattate prima di 24 ore. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere le acque sotterranee non applicare questo o altri prodotti contenenti tebuconazolo più di una volta l'anno sui cereali invernali o primaverili. Per proteggere gli organismi acquatici, deve essere presente una fascia di rispetto vegetata non trattata di 5 metri dai corpi superficiali, per l'uso su cereali primaverili. Per proteggere gli organismi acquatici, deve essere presente una fascia di rispetto vegetata non trattata di 20 metri dai corpi idrici superficiali per l'uso su cereali invernali. Conservare il prodotto nel contenitore originale in luoghi locali freschi e ventilati, arieggiati, a temperatura ambiente, lontano da alimenti o mangimi e da bevande, fuori dalla portata dei bambini.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: organi interessati: occhi, congiuntive, tratto respiratorio (naso, gola, trachea, bronchi, polmoni), fegato, reni, mucose, lesioni cutanee su base allergica (da sintomi dermatiti eritematose a dermatiti allergizzanti). Sintomi: tosse, broncospasmo e dispnea per via bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili: tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunologico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. **Metabolismo:** dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. **Terapia:** sintomatica. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveneni.

PRIAM® TOP è un fungicida della famiglia chimica dei triazoli caratterizzato da elevati livelli di efficacia, proprietà sistemiche originali, polivalenza e permanenza contro numerose malattie, tra cui quelle dei cereali. Il tebuconazolo è un principio attivo sistemico con attività preventiva, curativa ed eradicante ed è caratterizzato da una modalità d'azione particolare per un triazolo (due siti d'azione distinti sulla biosintesi degli steroli). La formulazione in emulsione acquosa ne rende pratico e sicuro l'impiego.

FUNGICIDA SISTEMICO

MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO: PRIAM® TOP può essere utilizzato sulle seguenti colture:

COLTURE	MALATTIE CONTROVISTE	DOSE DI IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA
Frumento, Triticale	Fusariosi (<i>Fusarium</i> sp.), Ruggine bruciata (<i>Puccinia recondita</i>), Ruggine gialla (<i>Puccinia striiformis</i>)	1,0 l/ha	35 giorni
Orzo	Rincochosposi (<i>Rhynchospoia secalis</i>)		
Avena	Ruggine dell'ovino (<i>Puccinia coronata</i>)		

Frumento, Triticale, Orzo, Avena: intervenire alla comparsa delle malattie diluendo la dose prescritta di prodotto con 150-300 litri d'acqua per ettaro.

Numero di trattamenti: 1

PRIAM® TOP è un inibitore della biosintesi degli steroli (IBS). Tenuto conto della presenza in alcuni vigneti di ceppi di oidio resistenti ai fungicidi di questa famiglia chimica (IBS1) ed al fine di prevenirne la diffusione si raccomanda di:

- utilizzare **PRIAM® TOP** alla dose piena prevista;
- limitare il numero di trattamenti con questo ed altri prodotti contenenti triazoli (IBS) a quanto riportato in etichetta durante tutta la campagna;
- fare attenzione alla qualità della polverizzazione

PREPARAZIONE DELLA MISCELA: Agitare bene la confezione prima dell'uso. Versare la quantità necessaria di **PRIAM® TOP** nel serbatoio riempito a metà mantenendo l'agitatore in funzione, quindi riempire fino al livello richiesto. Mantenere l'agitatore in funzione per tutta la durata del trattamento finché il serbatoio non risulti completamente vuoto. Utilizzare la miscela subito dopo la miscelazione.

COMPATIBILITÀ: Consultare il distributore ed il tecnico di riferimento. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE

- Per lavorazioni agricole tra le 24 e le 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.
- Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.
- Evitare che le donne in età fertile utilizzino il formulato o siano ad esso professionalmente esposte.
- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Non applicare con mezzi aerei.
- Da non versarsi sfuso.
- Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua.
- Operare in assenza di vento.
- Il contenitore non può essere riutilizzato.
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

BOTTIGLIA	HDPE 2
TAPPO	HDPE 2
ETICHETTA	PP 5

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 7/10/2016 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 2/12/2024.



COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.
C/ Viladomat, 321, 5° - Tel.: 93 495 25 00 - 08029 - Barcelona (España)
E-mail: masso@cqmasso.com - www.massagro.com

AV0208
V3