

157 x 62 mm

ERASOL®



ERBICIDA SELETTIVO PER IL DISERBO IN POST-EMERGENZA DEL FRUMENTO TENERO E DURO E DELL'ORZO
GRANULI IDRODISPERSIBILI

MECCANISMO D'AZIONE: HRAC B



Partita N.: Vedi corpo della confezione

CONTENUTO NETTO: 100 g

ERASOL®

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono:

TIFENSULFURON METILE PURO g 50

TRIBENURON METILE PURO g 25

COFORMULANTI q. b. a g 100

Registrazione Ministero della Salute
n. 17308 del 02/10/2018

Nufarm Italia S.r.l.
Via Guelfa, 5 Bologna
Tel. 051 0394022

Stabilimenti di produzione:
Torre S.r.l. - Trecenturi (SV)
C/O Vertemata ambientale



UFI: XV5V-VRK8-GFD-1WGPB

510010677_072025



8 424084 1043500



COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.
Viladomat, 321, 5º - 08029 Barcelona (Spagna) Tel. +34 93 495 25 00
E-mail: masso@cqmasso.com - www.massoagro.com

* Marchio registrato Nufarm
Etichetta autorizzata con decreto
dirigenziale del 22/07/2024

V3

FRONT PAGE

PRINTABLE AREA

151 x 54 mm

157 x 62 mm

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali. Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dalla zona non coltivata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Tifensulfuron metile 50% e Tribenuron metile 25% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

TIFENSULFURON METILE: -

TRIBENURON METILE: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Non si conosce la sintomatologia dell'intossicazione sperimentale. Irritazione oculare e cutanea.

Terapia: sintomatica

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE: ERASOL® è un erbicida sistemico di post-emergenza. Viene rapidamente assorbito da foglie e radici e traslocato agli apici vegetativi delle piante trattate; subito dopo l'assorbimento, ERASOL® blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che possono manifestarsi da 1 a 2 settimane dall'applicazione. Condizioni di caldo e umido dopo il trattamento favoriscono la velocità d'azione.

EPOCA DI IMPIEGO: Il prodotto si impiega in post-emergenza del frumento tenero e duro e dell'orzo contro infestanti a foglia larga.

DOSI D'IMPIEGO: 30-50 g/ha da distribuire con 200-400 litri d'acqua dallo stadio di tre foglie fino a quello di botticella delle colture.

È attivo su: Adonide (*Adonis estivalis*), Aglio delle vigne (*Allium vineale*), Amaranto (*Amaranthus* spp.), Camomilla Bastarda (*Anthemis cotula*), Coriandolo (*Bifora radians*), Convolvolo nero (*Fallopia convolvulus*), Borsa del pastore (*Capsella bursa pastoris*), Farinello comune (*Chenopodium album*), Geranio (*Geranium dissectum*), Falsa ortica (*Lactuca purpureum*), Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Miagro liscio (*Myragrum perfoliatum*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Polygono persicaria (*Polygonum persicaria*), Fava porcellana (*Portulaca oleracea*), Ranuncolo (*Ranunculus acer*), Rapistro (*Rapistrum rugosum*), Romice (*Rumex* spp.), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Centocchio (*Stellaria media*), Veccia (*Vicia sativa*), Viola (*Viola* spp.).

Infestanti mediamente sensibili: Stoppione (*Cirsium* spp.), Vilucchio bianco (*Galystegia sepium*), Vilucchio (*Convolvulus arvensis*), Fiordaliso (*Centaurea cyanus*), Crisantemo delle messi (*Chrysanthemum segetum*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Pettine di Venere (*Scandix pecten veneris*), Veronica (*Veronica persica*).

Per il controllo di queste infestanti si consiglia di utilizzare le dosi più elevate.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: ERASOL® alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento; portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo e non deve essere conservata in taniche o serbatoi per trattamenti successivi.

157 x 62 mm

AVVERTENZE AGRONOMICHE: Il prodotto contiene principi attivi inibitori dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare o miscelare a questo erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

AVVERTENZE:

- † Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione.
- † Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
- † Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
 - a) Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
 - b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; aggiungere ammoniaca (una soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 litri/lt di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
 - c) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto al punto b).
 - d) Rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
 - e) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%.
- † Dopo un trattamento con ERASOL® si sconsiglia la trasemina di leguminose foraggere.

COMPATIBILITÀ: AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. / NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA. / OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. / DA NON VENDERSI SFUSO. / IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. / IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

PRINTABLE AREA
144 x 54 mm

www.massooagro.com

GLUE PAGE
NON-PRINTABLE

Please remove before printing.
Retirez s'il vous plaît avant l'impression
Por favor, eliminar antes de imprimir.



BASE

NON PRINTABLE

www.masssoagro.com

Please remove before printing.
Retirez s'il vous plait avant l'impression
Por favor, eliminar antes de imprimir.

157 x 62 mm

ERASOL[®]



ERBICIDA SELETTIVO PER IL DISERBO IN POST-EMERGENZA DEL FRUMENTO TENERO E DURO E DELL'ORZO
GRANULI IDRODISPERSIBILI

MECCANISMO D'AZIONE: HRAC B



Partita N.: Vedi corpo della confezione

CONTENUTO NETTO: 100 g

ERASOL[®]

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono:

TIFENSULFURON METILE PURO g 50

TRIBENURON METILE PURO g 25

COFORMULANTI q. b. a g 100

Registrazione Ministero della Salute
n. 17308 del 02/10/2018

Nufarm Italia S.r.l.
Via Guelfa, 5 Bologna
Tel. 051 0394022

Stabilimenti di produzione:
Torre S.r.l. - Tarrenieri (SV)



Attestato di certificazione ambientale

UFI: XV5V-VRK8-GDD-WGPH

510010677_072025



8 424084 043500



COMERCIAL QUIMICA MASSO, S.A.

Viladomat, 321, 5^a - 08029 Barcelona (Spagna) Tel. +34 93 495 25 00

E-mail: masso@cqmasso.com - www.massoagro.com

* Marchio registrato Nufarm

Etichetta autorizzata con decreto

dirigenziale del 22/07/2024



V3

www.masso.com

www.masso.com