



SUNNY®

ERBICIDA GRAMINICIDA DI POST-EMERGENZA SELETTIVO PER NUMEROSE COLTURE SIA ERBACEE SIA ARBOREE (CONCENTRATO EMULSIONABILE)

ETICHETTATURA AMBIENTALE



Per maggiori informazioni
scansiona il codice QR

SUNNY

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono: fluazifop-P-butile puro g 13,40 (= 125 g/l); coformulanti q.b. a g 100

Contiene fluazifop-p-butile: può creare reazioni allergiche

Contiene 1-octanol, calcio dodecylbenzene e 2-methylpropan-1-ol sulphonate

Registrazione Ministero della Salute n. 17741 del 04/12/2020

INDICAZIONI DI PERICOLO: H361 Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P281 Utilizzare il dispositivo di protezione individuale previsto. P308+P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P405 Racchiudere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

NUFARM ITALIA S.r.l., Viale Luigi Majno 17/A - 20122 Milano
Sede amm.va via Guelfa 5 - 40138 Bologna. Tel. 051 0394022

Stabilimenti di produzione: NUFARM S.A.S., Gaillon (Francia)

Distribuito da: COMERCIAL QUIMICA MASSO, S.A., Viale Magellani 132, Sesto San Giovanni (MI)

Partita n.: vedi corpo della confezione

© Marchio registrato Nufarm



COMERCIAL QUIMICA MASSO, S.A.
Viladomí de Guelfa, 5 - 46029 Barcelona (España) Tel. 93 495 25 00 - E-mail: masso@cqmasso.com

ATTENZIONE

CONTENUTO NETTO:

1 litro



SUNNY®

ERBICIDA

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose orofaringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflexia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione; gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica. Ospedalizzare.

Controindicazioni: non provocare il vomito poiché nel formulato sono presenti distillati del petrolio come solventi. **Consultare un Centro Antiveletti.**

CARATTERISTICHE

SUNNY® è un erbicida specifico per il controllo delle infestanti graminacee. Esso è assorbito dalle parti verdi delle piante e traslocato, per via sistemica, sia verso gli apici vegetativi sia verso le radici, i rizomi e gli stoloni.

Il prodotto è assorbito rapidamente (entro 3 ore dal trattamento) ed i primi sintomi appaiono nell'ambito di una settimana.

MODALITÀ DI IMPIEGO

SUNNY® si distribuisce con attrezzature a bassa pressione (2-3 atm) impiegando ugelli a ventaglio o a mezzogiorno. Intervenire durante le ore fresche del giorno, su infestanti in attiva crescita, impiegando volumi d'acqua medi (100-400 l/ha) onde favorire la uniforme copertura della vegetazione. Trattare quando le infestanti graminacee sono in stadio di

3-3 foglie/accestimento per avena (*Avena* spp.), bromo (*Bromus* spp.), coda di volpe (*Alopecurus* spp.), setaria (*Digitaria sanguinalis*), giavone (*Echinochloa* spp.), setaria (*Setaria* spp.), sorghetta da seme (*Sorghum halepense*), loglio (*Lolium* spp.), calaride (*Phalaris* spp.), ricacci di frumento ed orzo; la sorghetta da rizoma (*Sorghum halepense*) va trattata ad un'altezza di 30-50 cm. Erba tenerola (*Poa annua*) è mediamente resistente.

Non usare su terreni sabbiosi.

Da non usare sullo stesso appezzamento più di due volte all'anno.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

COMPATIBILITÀ

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta:

Agrumi, pesco, ciliegio, susino, melo, pero, nocciolo, olivo, vite, carciofo, lattuga, cicoria, cetriolo, melanzana, carota, ravanella, cipolla: 30 giorni.

Patata: 50 giorni.

Barbabietola da zucchero, trifoglio, tabacco: 60 giorni.

Girasole, Colza, Soia: 90 giorni

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CAMPI E DOSI DI IMPIEGO

COLTURE	INFESTANTI	DOSE (l/ha)
Agrumi: arancio, mandarino, limone, clementino, cedro, pompelmo, bergamotto, chinotto, kumquat, arancio amaro	Graminacee a nascita autunnale (<i>Avena</i> spp., <i>Phalaris</i> spp., <i>Alopecurus</i> spp., <i>Bromus</i> spp. e ricacci di frumento e orzo) fino a inizio accestimento	0,75 - 1,0
Drupacee: pesco, nectarina e (Pitcairca), ciliegio, susino	Graminacee a nascita autunnale (<i>Lolium</i> spp.) fino a inizio accestimento	1,0 - 1,25
Pomacee: melo, pero	Graminacee a nascita primaverile (<i>Echinochloa</i> spp., <i>Setaria</i> spp., <i>Digitaria</i> spp.) fino a inizio accestimento	1,25 - 2,0
Fruttiferi da frutta a guscio: nocciolo	Sorghetta da rizoma	2,0
Olivo, Vite		
Ortaggi: lattuga, cicoria, carciofo, cetriolo, melanzana, carota, ravanella, cipolla		
Fava da granella, fagiolino, fagiolo da granella, pisello.		
(Intervenire prima della fioritura)		
Patata		
Barbabietola da zucchero		
Oleaginose: girasole, soia, colza		
Foraggiere leguminose: trifoglio		
Tabacco		
Floreali in pieno campo ed in serra: rosa, garofano, liliacee, bulbose, gerbera, geranio, viola, petunia, crisantemo, strelicia		

ATTENZIONE

Adottare le dosi minori con infestanti nello stadio più giovanile ed in condizioni ottimali di impiego. Nelle applicazioni localizzate adottare la concentrazione del 2% (2 lt di SUNNY® in 100 lt d'acqua). Non trattare infestanti che si trovano in stato di stress (siccità, danneggiamento, abbassamento di temperatura, pascolo). L'efficacia del prodotto può essere ridotta in presenza di terreno secco ad umidità relativa dell'aria inferiore al 60%.

Da non applicare con mezzi aerei.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

Non operare contro vento.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.