



CUSPIDE

FUNGICIDA SISTEMICO

CONCENTRATO SOLUBILE (SL)
Meccanismo d'azione gruppi: 33, 28 (FRAC)

CUSPIDE

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono:

PROPAMOCARB puro 47,3 g (530 g/L)
FOSETYL puro 27,7 g (310 g/L)
Coformulanti q. b. a g. 100

Registrazione n. 19205 del 13/01/2026 del Ministero della Salute

INDICAZIONI DI PERICOLO:

H317 Può provocare una reazione allergica della pelle. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso. P362+P364 Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P333 + P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

UFI: X3VE-PWRC-MPOP-3NUW

Titolare dell'autorizzazione:

Sharda Cropchem España, S.L.

Ed. Atalayas Business Center, Carril Condomina nº3, 12th Floor
30006 Murcia, Spagna - Tel. 02 3604 2884

Officine di produzione e confezionamento:

Agrology, S.A.

Industrial Area of Thessaloniki, P.O. Box 1089, 57022 Sindos, Greece

Distribuito da:

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A. - Succursale Italia:

V. Marelli, 132, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italia - Tel: +39 02 0996 8107



ATTENZIONE

Partita n.
Vedere la confezione

CONTENUTO NETTO:

1 L



COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.
C/ Viladomat, 121, 5º - 08029 Barcelona (España) - Tel.: 93 495 25 00
E-mail: masso@quimasso.com - www.massoaagro.com

TAPPO	HDPE 2	
FLACONE	HDPE 2	PLASTICA
ETICHETTA	PAP 22	
RACCOLTA PLASTICA		



PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Indossare indumenti da lavoro e guanti durante le fasi di miscelazione, carico ed applicazione. In aggiunta, indossare abiti impermeabili per l'impiego in alta densità d'impianto. Indossare guanti durante le attività di rientro. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveleini.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CUSPIDE è un fungicida sistemico per la protezione delle colture orticole, del tabacco e delle colture floreali e ornamentali.

Il prodotto ha una spiccata attività sistemica in senso acropeto per cui è indicato, oltre che per le applicazioni fogliari, anche per le applicazioni al terreno, in quanto dal sistema radicale trasloca rapidamente nelle diverse parti della pianta.

I migliori risultati si ottengono con trattamenti preventivi volti ad impedire l'insediamento dei patogeni nell'ospite.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Pomodoro, melanzana, peperone: Trattamenti ai semenzai e al terreno contro *Pythium* spp.
- Cocomero, cetriolo, zucchini: Trattamenti ai semenzai e al terreno contro *Pythium* spp.
- Cavolfiore, cavolo broccolo, tabacco: Trattamenti ai semenzai contro *Pythium* spp.
- Lattughe e insalate: Trattamenti ai semenzai contro *Pythium* spp.

Trattamenti ai semenzai (in serra): Intervenire con un unico trattamento alla semina alla dose di 6 mL/m² (150-300 mL/hL) oppure con 2 trattamenti da 3 mL/m² (75-150 mL/hL) ciascuno: il primo alla semina ed il secondo dopo circa due settimane utilizzando 2-4 litri di acqua al metro quadrato per trattamento.

Trattamenti al terreno (in campo e in serra): Intervenire al trapianto e ripetere il trattamento dopo circa due settimane, per un massimo di due irrigazioni localizzate nell'area esplorata dalle radici delle piante, alle dosi di 2-3 L/ha (100-150 mL/hL) utilizzando volumi di acqua di 2000 L/ha. Distribuire il prodotto con acqua su terreno umido evitando un'eccessiva percolazione. Si consiglia di immettere il prodotto nella fase finale del turno irriguo. Il prodotto, applicato per irrigazione localizzata, rapidamente assorbito per via radicale e traslocato alla vegetazione in rapida crescita, manifesta una significativa azione collaterale nei confronti di *P. cubensis* delle cucurbitacee permettendo di intervenire tempestivamente a difesa delle giovani piantine e limitando il numero di applicazioni con fungicidi fogliari nelle fasi di sviluppo in pieno campo.

CUSPIDE

RESISTENZA

È possibile che si verifichi un basso livello di resistenza al prodotto.

È consigliabile alternare questo prodotto con fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione.

COMPATIBILITÀ

Si sconsiglia l'impiego in miscela con rame e con i concimi fogliari contenenti azoto (nitrico e ammoniacale).

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE

DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA.

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO.

IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.

DA NON VENDERSI SFUSO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 13 gennaio 2026 e modificata ai sensi del D.D. emesso in data 13 marzo 2026.