

89 mm

KEMPO SORBIE INSETTICIDA

COMPATIBILITÀ:
KEMPO® SORBIE non è miscibile con i formulati a reazione alcalina.

AVVERTENZE:
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Non compatibile con agrofarmaci a reazione alcalina
Fitotossicità: KEMPO® SORBIE non ha evidenziato fenomeni di fitotossicità nelle colture indicate in etichetta. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

6

90 mm

KEMPO SORBIE INSETTICIDA

ATTENZIONE:
DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO (Salvo impieghi non agricoli espressamente autorizzati). Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
NON OPERARE CONTRO VENTO.
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI D'USO.
DA NON VENDERSI SFUSO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 22/07/2024

7

90 mm

Product label for KEMPO SORBIE insecticide, 95 x 125 mm. Includes logo, QR code, and detailed safety instructions in Italian.

www.massocq.com

95 x 125 mm

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Il prodotto è nocivo per api ed artropodi utili. Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate. Non trattare durante la fioritura. Effettuare lo sfalcio delle infestanti fiorite prima del trattamento.

Per proteggere gli organismi acquatici è indispensabile:
- Una fascia di rispetto di 5 metri quando si trattano colture estensive (barbabietola da zucchero, oleaginose, foraggere) e colture orticole.
- Una fascia di rispetto di 30 metri, in associazione a strumentazione meccanica che abbatta del 50% la deriva, quando si trattano i fruttiferi.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: Bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapicamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: Tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinite, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: Sintomatica e di rianimazione.
Consultare un Centro Antiveneni.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Insetticida a base di lambda-cialotrina, principio attivo dotato di ampio spettro d'azione ed elevata efficacia. Agisce prevalentemente per contatto e secondariamente per ingestione, offre anche un effetto repellente nei confronti dei fitofagi ed agisce anche a dosi di principio attivo contenuti.
KEMPO® SORBIE svolge un rapido effetto di azione ed una prolungata durata d'azione. Le dosi di seguito riportate per colture parassitate si riferiscono ad ettaro, si riporta anche il quantitativo d'acqua necessario per applicazioni a trattamenti operanti a volumi normali in relazione alla dimensione delle piante (qualora si utilizzino volumi di acqua ridotti, deve essere rispettata la stessa dose di prodotto ad ettaro indicata per i volumi normali).

2

90 mm

Table with 4 columns: COLTURA, PARASSITI CONTROLLATI, DOSI DI PRODOTTO PER ETTARO, DOSI DI PRINCIPALI VOLUMI DI ACQUA/ETTARO. Lists various crops and pests like Arancio, Mandarino, Cocciniglie, Afidi, etc.

3

90 mm

KEMPO SORBIE INSETTICIDA

Effettuare per ciclo colturale, al massimo 1 trattamento per Frumento, Orzo, Colza e 2 applicazioni su tutte le altre colture.

INTERVALLO DI SICUREZZA (sospendere i trattamenti prima della raccolta):

Table with 2 columns: COLTURA, INTERVALLO. Lists crops like Mais, Sorgho, Lino, Frumento, Orzo, Colza, etc. with their respective safety intervals.

89 mm

Product label for KEMPO SORBIE insecticide, 95 x 125 mm. Includes logo, QR code, and detailed safety instructions in Italian.

9