



RADICAL MASSÓ PLUS

ERBICIDA

RADICAL MASSÓ PLUS

SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)

Diserbante per il controllo di mono e dicotiledoni

Meccanismo di azione HRAC: K1

COMPOSIZIONE:

g 100 di prodotto contengono:

Pendimethalin puro g 38,7 - 490 g/l

Coformulanti acqua g 61,3 - 510 g/l

INDICAZIONI DI PERICOLO: H361d: Sospettato di nuocere al feto. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208: Contiene 1,2-benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P200 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P308 + P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P391 Raccogliere la fuoriuscita. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale.

UFI: SRP8-QG7F-H706-V8F6

Stabilimento di produzione e confezionamento: Synthos Agro Sp. z o.o. ul. Chemiczków 1, 32-600 Oświęcim, Polonia

Titolare dell'autorizzazione: Sharda Cropchem Italia S.L., Ed. Agropolis Business Center, Carril Condomina, 3, 12th Floor 30006 Murcia (Spagna) Tel. +39 02 3604 2884

Distribuito da: COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ S.A. Succursale Italia: Viale Marelli, 132, 20099 Sesto San Giovanni (MI) Italia - Tel. +39 02 0996 6107

CONTENUTO NETTO: 5 litri

Partita N.: Vedere sulla confezione

Autorizzazione del Ministero della Salute n. 15745 del 14/11/2014.



ATTENZIONE



COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A., Viladomat, 321, 5º - 08029 Barcelona (Spagna)
Tel. +34 93 495 25 00 - E-mail: masso@cquimasso.com - www.massagro.com

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 27 Novembre 2023 e modificata ai sensi dell'art.7, comma 1, D.P.R. 55/2012 con validità dal 1 Dicembre 2023.

TAPPO HDPE 2
FIAZIONE HDPE 2
ETICHETTA PET 1
Verifica le disposizioni del tuo comune



PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Indossare guanti adatti durante la fase di miscelazione e carico del prodotto. Indossare guanti adatti per rientrare nell'area trattata. Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di rispetto vegetata non trattata dai corpi idrici superficiali di: 20 m in associazione ad ugelli di fine barra che riducano la deriva del 25% per girasole, mais, pisello, patata, cece, fagioli, fagiolini, fava e favino, soia, carota, lattuga e simili, cavolfiore, tabacco, piante ornamentali, pioppo, tappeti erbosi; 10 m in associazione ad ugelli di fine barra che riducano la deriva del 25% per asparago, peperone, melo, pero, arachide, vite; 20 m in associazione ad ugelli di fine barra che riducano la deriva del 30% per albicocco, nettarina, pesco. Per proteggere le piante non bersaglio mantenere una fascia di rispetto di 5 metri.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: Nell'animale da esperimento si osservano depressione SNC, dispnea, diuresi, convulsioni. **Terapia:** Sintomatica. Consultare un centro antivenali.

CARATTERISTICHE: RADICAL MASSO PLUS è un diserbante che agisce nei confronti della germinazione dei semi delle comuni infestanti mono e dicotiledoni.

Monocotiledoni: *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella), *Echinochloa crus-galli* (Giovane comune), *Setaria spp.* (Pabbio), *Sorghum halepense* (Sorghetto), *Panicum dichotomiflorum* (Giovane americano).

Dicotiledoni: *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Atriplex spp.* (Atriplice), *Heliotropium europaeum* (Elliotropio selvatico), *Cardamine hirsuta* (Dentaria), *Capsella bursa pastoris* (Borsa del pastore), *Chenopodium album* (Farinaccio selvatico), *Euphorbia spp.* (Euforbia), *Fumaria spp.* (Fumaria), *Mycositis arvensis*, *Mercurialis annua* (Mercorella), *Papaver rhoeas* (Papavero), *Portulaca oleracea* (Erba cipollina), *Poligonum spp.* (Poligono), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Thlaspi arvenses* (Erba storna), *Urtica urens* (Ortica comune), *Veronica spp.* (Veronica).

DOSI D'IMPIEGO: Effettuare il trattamento su terreno ben livellato e lavorato. In assenza di pioggia dopo 7-10 giorni dal trattamento irrigare in modo da favorire la penetrazione del prodotto nei primi strati superficiali del terreno. Seminare in modo uniforme ad una profondità di 3-4 cm, evitando che alcuni semi rimangano scoperti in superficie.

Mais: Applicare in pre-emergenza alla dose di 4.4 l/ha.

Girasole: Applicare in pre-emergenza alla dose di 4.4 l/ha.

Fagioli e Fagiolini: Applicare in pre-emergenza alla dose di 3.3 l/ha.

Fava e Favino: Applicare in pre-emergenza alla dose di 3.3 l/ha.

Pisello: Applicare in pre-emergenza alla dose di 3.3-4.1 l/ha.

Cece: Applicare in pre-emergenza alla dose di 3.3-4.1 l/ha.

Carota: Applicare in pre-emergenza alla dose di 3.3 l/ha.

Asparago: Applicare durante la fase di riposo vegetativo alla dose di 3.3 l/ha.

Patata: Applicare in pre-emergenza alla dose di 4.4 l/ha.

Peperone: Applicare alla fase di pre-emergenza o pre-trapianto alla dose di 3.3 l/ha.

Cavolfiore: Applicare alla fase di pre-trapianto alla dose di 3.3 l/ha.

Soia: Applicare alla fase di pre-emergenza alla dose di 4.4 l/ha.

Lattughe e simili (eccetto rucola): Applicare alla fase di pre-emergenza o pre-trapianto alla dose di 3 l/ha.

Vite: Applicare il prodotto lungo l'interfilare durante il periodo vegetativo alla dose di 3.3 l/ha.

Melo, Pero: Applicare il prodotto lungo l'interfilare durante la raccolta e la formazione dei nuovi frutti alla dose di 3.3 l/ha.

Albicocco, Nectarina, Pesco: Applicare il prodotto lungo l'interfilare il periodo della raccolta e la formazione dei nuovi frutti alla dose di 3.3 l/ha.

Arachide: Applicare in pre-emergenza alla dose di 3.3 l/ha.

Piante ornamentali anche in vaso: Applicare in post-trapianto alla dose di 3.3-3 l/ha.

Pioppo: Applicare il prodotto lungo l'interfilare durante la fase di post-trapianto alla dose di 2.3-3 l/ha.

Tabacco: Applicare alla fase di pre-trapianto alla dose di 4.4 l/ha.

Tappeti erbosi: Applicare durante il periodo autunnale o primaverile, in post-emergenza alla dose di 2.6-3.3 l/ha.

Applicare il prodotto con un quantitativo di acqua pari a 200-800 l/ha in funzione del tipo di pompa.

Effettuare un solo intervento per ciclo culturale per tutte le colture.

ISTRUZIONI PER L'USO: I migliori risultati di RADICAL MASSO PLUS si ottengono su terreni dotati di una discreta umidità ed in assenza di pioggia nei 7 giorni successivi al trattamento. Non intervenire nel terreno; da non applicare su terreni seminati; da non applicare su piante soggette che manifestano sintomi di stress; limitarsi a preparare la dose necessaria di prodotto da impiegare nel trattamento; evitare che il prodotto entri in contatto con piante non bersaglio; evitare la fuoriuscita del prodotto; lavare immediatamente indumenti e parti del corpo venute in contatto con il prodotto; lavare immediatamente i macchinari e l'attrezzatura adoperati per l'impiego del prodotto.

Per la preparazione della miscela procedere nel modo seguente: riempire il serbatoio con acqua pulita e continuando ad agitare aggiungere il quantitativo di RADICAL MASSO PLUS necessario; portare a termine e continuare ad agitare. Distribuire il prodotto nebulizzando uniformemente da garantire una completa copertura delle colture/aree trattate. Pulire immediatamente il materiale d'applicazione effettuando 3 risciacqui.

ATTENZIONE: Il prodotto può essere fitotossico nei confronti di colture non indicate in questa etichetta.

RESISTENZE: Il rischio che possano insorgere fenomeni di resistenze non può escludersi, poiché queste si manifestano nei confronti di molteplici principi attivi. Eventuali danni o perdite causate dai manifestarsi delle resistenze non possono essere attribuite alla responsabilità del prodotto. Si consiglia di utilizzare diserbanti a diversa modalità di azione e di seguire le indicazioni riportate in questa etichetta.

AVVERTENZA: In caso di miscelazione con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta per l'asparago e 75 giorni prima della raccolta per lattughe e simili.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Operare in assenza di vento; Da non versarsi sulla pelle; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; il contenitore non può essere riutilizzato.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.