



ABANTO

INSETTICIDA A BASE DI PIRETRO NATURALE

ABANTO

INSETTICIDA A BASE DI PIRETRO NATURALE
CONCENTRATO EMULSIONABILE - Meccanismo d'azione: IRAC 3A
 Registrazione Ministero della Salute n. 15779 del 11/04/2013

COMPOSIZIONE:

PIRETRINE pure
 (da estratto di piretro 480 g/Kg) g. 4,27 (40 g/l)
 Coformulanti q.b. a g. 100

ALBAUGH TKI d.o.o. - Grajski trg 21, SI-2327 RA, E, Slovenia
 Tel.: +386 2 60 90 2113 - www.albaugh.eu
 Informazioni Tecniche: 800 986 776
 Informazioni di emergenza CARECHEM (24h): +44 (0) 1235 239 670
 (chiamate gestite in lingua italiana)

Stabilimenti di produzione:
INDUSTRIAS AFRASA S.A. - C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro
 E-46988 Paterna (Valencia) Spagna

Stabilimento di confezionamento:
Vebi Istituto Biochimico s.r.l. - Via Desman, 43 - 35010 S. Eufemia di Borgoricco (PD)

Distribuito da:
COMERCIAL QUIMICA MASSO S.A. Succ. ITALIA - Viale Marelli, 132
 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Tel. 02 0996 6107



ATTENZIONE

REAZIONE: P391 Raccolpire il materiale sversato.
CONSERVAZIONE: P201 Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P201 Smaltire il prodotto/recupero in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH208 Contiene estratto di piretro. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Particolare attento:
 vedi timbro sulla confezione

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore e l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PREVENZIONE: P201 Non disperdere nell'ambiente. P202 Indossare guanti protettivi.

CONTENUTO: 1 litro

ABANTO

INSETTICIDA

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto indossare occhiali protettivi, guanti e tuta da lavoro. Non rientrare nelle zone trattate prima che la coltura risulti completamente asciutta. Per proteggere gli organismi acquatici osservare una fascia di rispetto dai corpi idrici superficiali di: 10 metri vegetati con utilizzo di ugelli con riduzione della deriva del 50% per orticole a frutto e a foglia; 10 metri vegetati con utilizzo di ugelli con riduzione della deriva del 50% per vite; 20 metri vegetati con utilizzo di ugelli con riduzione della deriva del 90% per pesco e nettario (post fioritura); 30 metri vegetati con utilizzo di ugelli con riduzione della deriva del 90% per drupacee (in pre-fioritura). Per proteggere gli artropodi non bersaglio osservare una fascia di rispetto di 5 metri da zona non coltivata per drupacee, percoche, per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura. Non utilizzare quando le api sono attive. Non applicare il prodotto su piante infestanti in fiore. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque superficiali. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: Le piretrine bloccano la trasmissione nervosa iper-stimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: Tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, emitema, collasso vascolare, nerofisco. Terapia: Sintomatica.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE: Il prodotto è un insetticida ad ampio spettro di azione a base di Piretro naturale. Supporto liquido di origine vegetale. Agisce prevalentemente per contatto ed è caratterizzato da una rapida e buona efficacia nel controllare numerosi tassiti su diverse colture agrarie, sia in pieno campo che in serra, in tutte le stagioni. La sua breve persistenza lo rende ideale per l'utilizzo in prossimità del lancio di insetti utili nel prodotto. È consigliato nei programmi di difesa sia integrata che biologica e nell'impiego alternato ad altri prodotti per la gestione della resistenza.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO:

Drupacee (pesche, nectarine, albicocche, susine, ciliegie): Contro Afidi (*Myzus persicae*) trattare a inizio infestazione alla dose di 0,75 l/ha pari a 75 ml/hi-90 ml/hi utilizzando un volume di 10 hl/ha di acqua. Massimo 2 interventi all'anno. Per albicocche, susine, ciliegie limitare i trattamenti alla pre-fioritura.

Vite (da tavola e da vigna): Contro Afide, Scudo e Coccinelle (post-fioritura stadio BBCH 75 (acino dimensioni pisello)) alla dose di 0,75 l/ha pari a 75 ml/hi-90 ml/hi utilizzando un volume di 10 hl/ha di acqua. Massimo 2 interventi all'anno.

Pomodoro, Melanzana, Peperone (in campo e in serra): Contro Aleurodidi (*Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*) trattare a inizio infestazione, prima del rilascio degli artropodi utili, alla dose di 0,75 l/ha pari a 75-90 ml/hi utilizzando un volume di 8-10 hl/ha di acqua. Massimo 2 interventi per ciclo di coltivazione.

Cetrioli, Zucchini (in campo e in serra): Contro Aleurodidi (*Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*) trattare a inizio infestazione, prima del rilascio degli artropodi utili, alla dose di 0,75 l/ha pari a 75-90 ml/hi utilizzando un volume di 8-10 hl/ha di acqua. Massimo 2 interventi per ciclo di coltivazione.

Melone, Cava, Cocomero (in campo e in serra): Contro Aleurodidi (*Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*) trattare a inizio infestazione, prima del rilascio degli artropodi utili, alla dose di 0,75 l/ha pari a 75-90 ml/hi utilizzando un volume di 8-10 hl/ha di acqua. Massimo 2 interventi per ciclo di coltivazione.

Lattughe e insalate (compresi prodotti baby leaf) (in campo e in serra): Contro Afidi (*Nasonovia ribisnigri*, *Aphis gossypii*, *Aphis fabae*) trattare a inizio infestazione alla dose di 0,6 l/ha pari a 75-90 ml/hi utilizzando un volume di 6,5-8 hl/ha di acqua. Massimo 2 interventi per ciclo di coltivazione.

Spinaci e simili (in campo e in serra): Contro Afidi (*Nasonovia ribisnigri*, *Aphis gossypii*, *Aphis fabae*) trattare a inizio infestazione alla dose di 0,6 l/ha pari a 75-90 ml/hi utilizzando un volume di 6,5-8 hl/ha di acqua. Massimo 2 interventi per ciclo di coltivazione.

Avvertenze agronomiche: I trattamenti devono essere eseguiti con un intervallo minimo di 7 giorni, in giornate di tempo buono, possibilmente la sera e comunque nelle ore più fresche. Utilizzare volumi d'acqua e pressioni adeguate per garantire una buona copertura delle colture, curando in particolar modo la pagina inferiore delle foglie. In caso di impiego di volumi d'acqua diversi, adeguare le dosi per ettolitro in modo tale da distribuire per unità di superficie la dose per ettaro indicata.

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE: Versare la dose prevista di prodotto nel serbatoio dell'irroratrice parzialmente riempita d'acqua, mettere in funzione l'agitatore e completare il riempimento fino al volume desiderato. Verificare che il pH dell'acqua non sia basico (>7), se del caso stabilizzare il pH dell'acqua con i preparati autorizzati in commercio a questo scopo. Utilizzare la soluzione ottenuta lo stesso giorno della preparazione.

COMPATIBILITÀ: Non compatibile con prodotti a reazione alcalina (es. Calce, Poltiglia Bordolese alcalina, Polisolfuri).

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto è generalmente selettivo nelle normali condizioni di impiego per le colture riportate in etichetta. Nel caso di varietà poco diffuse o di recente introduzione si consiglia di effettuare saggi preliminari su piccole superfici.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta di vite, pesco, nettario e percoche, 2 giorni prima della raccolta di lattughe e altre insalate (compresi prodotti baby leaf), spinaci e simili, 1 giorno per pomodoro, melanzana, peperone e cucurbitacee.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.
DA NON VENDERSI SFUSO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE
DISPOSTO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.



8

92



COMERCIAL QUIMICA MASSO S.A.
 Viladomus 221 - 08020 Barcelonnette (Francia)
 Tel. 93 45 05 00 - Email: masso@cqms.com - www.massagro.com

Etichetta autorizzata con decreto
 dirigenziale del 19.02.2025

FLACONE	TAPPO	SIGILLO BOTTIGLIA
Vedere codice riportato su fondo	C/HPDE 81	C/ALU 90