

Mag-Cal



**PELIGRO
PERICOLO**

H318 Provoca lesiones oculares graves. H361 Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P202 No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. P280 Llevar ropa de protección, equipo de protección para los ojos y la cara. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización. P501 Eliminar el contenido y el recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, de conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional. **Contiene:** Calcio diformato y disodium pentaborate dehydrate. UFI: PJ74-90Q5-300M-7560

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Tel. 915 620 420 (En ambos casos, tenga a mano el envase o la etiqueta).

H318 Provoca gravi lesioni oculari. H361 Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P280 Indossare indumenti protettivi. Proteggere gli occhi, il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P501 Smaltire il prodotto e recipiente in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali. **Contiene:** Calcio diformato e disodium pentaborate dehydrate. UFI: PJ74-90Q5-300M-7560

CARACTERÍSTICAS / CARATTERISTICHE:

Corrector de carencias de calcio y magnesio para prevenir o corregir las deficiencias de estos elementos. Además de un aporte de boro, que interviene en la fecundación de la flor, obteniendo un mejor cuajado y un transporte de azúcares hacia los frutos durante la maduración. El molibdeno, cuyo aporte en pequeñas cantidades, está involucrado en la asimilación de los nutrientes por parte de las plantas.

Correttore di carenze di Calcio (Ca) e Magnesio (Mg) in grado di prevenire o correggere eventuali forme di carenza di tali elementi. **Mag-Cal** contiene inoltre del Boro (B), che intervenendo nella fecondazione del fiore ne permette una migliore allegazione ed un maggior trasporto di zuccheri verso i frutti durante la loro maturazione. Infine la presenza del Molibdeno (Mo), che anche in piccole quantità è coinvolto nell'assimilazione dei nutrienti da parte delle piante.

CULTIVO / COLTURA	DOSIS / DOSE	MOMENTO DE APLICACIÓN / EPOCA D'IMPIEGO
Frutales y cítricos Frutteti tutti ed agrumi	200-400 g/hl (2-4 Kg/ha)	Después de caída de pétalos y engorde de los frutos. Cada 15-20 días. En el caso de los cítricos realizar, además, una aplicación pre-floración. Dopo la caduta dei petali, fino ad ingrossamento dei frutti. Ripetere ogni 15-20 giorni. Nel caso degli agrumi, fare anche una dose prima in pre-floritura.
Olivo	200-400 g/hl (2-4 Kg/ha)	Aplicar una semana antes de floración y tres semanas después. / Applicare una settimana prima della fioritura e ripetere il trattamento circa 3 settimane dopo.
Uva de mesa y de vinificación Uva da vino e da tavola	200-400 g/hl (2-4 Kg/ha)	Realizar 1-2 tratamientos desde floración hasta cosecha. Applicare 1-2 trattamenti dalla fioritura fino alla raccolta.
Tomate, tomate de industria y pimiento Pomodoro, peperone ed ortaggi in generale	200-400 g/hl (2-4 Kg/ha)	Aplicar a partir de la formación de los ramilletes florales y cuajado del fruto hasta cosecha. Applicare dal momento della fioritura/allegazione dei frutticini, fino alla raccolta.
Hortícolas de hoja y brásicas Ortaggi a foglia e brassicacee	200-400 g/hl (2-4 Kg/ha)	Realizar 2-4 aplicaciones después del trasplante y previo a épocas de estrés. / Applicare 2-4 trattamenti successivamente al trapianto e prima dei verificarsi di un evento stressante per la cultura.
Cucurbitáceas / Cucurbitaceae (melone, comero, zucchini, cetriolo,...)	200-400 g/hl (2-4 Kg/ha)	Aplicar después del trasplante o al inicio de la floración. Applicare dopo il trapianto o all'inizio della fioritura.
Fresas y otras berries Fragole e piccoli frutti tutti	200-400 g/hl (2-4 Kg/ha)	Aplicar desde el cuajado hasta engorde de frutos. Applicare dal momento dell'allegazione fino all'ingrossamento dei frutticini.
Patata	200-400 g/hl (2-4 Kg/ha)	Realizar 2-4 aplicaciones durante la formación y engorde de los tubérculos. Applicare 2-4 trattamenti durante formazione e l'ingrossamento dei tubercoli.
Frutales tropicales y subtropicales (kiwi, platanera, etc.) / Fruttidie	200-400 g/hl (2-4 Kg/ha)	Incrementa número y peso de los frutos, mejora la calidad, firmeza y conservación. Incrementa il numero ed il peso dei frutti, la qualità e la durezza così come la loro conservabilità.

* Marca registrada por / registrata da: COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A., Barcelona

Producto fabricado y distribuido por / Prodotto da:



COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.
Viladomat, 321, 5º - 08029 Barcelona (España) - Tel. 93 495 25 00
E-mail: masso@cqmasso.com- www.massoagro.com

Distribuido da: COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A. - Succursale ITALIE:
Viale Marelli, 132 - 20099 Sesto San Giovanni (Milano) - Tel.+39 02 0996 6107 - E-mail:info.italia@cqmasso.com

Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del sistema integrado de gestión SIGFITO.

Questo prodotto è legalmente autorizzato in España, secondo il Real Decreto 506/2013 e viene immesso nel mercato italiano in base al principio di mutuo riconoscimento ai sensi del Regolamento CE n. 2019/515.

BOLSA/SACCHETTO /LOPE 4

Lote y fecha de fabricación: Ver marcado impreso
Lotto e data di fabbricazione: Vedere sulla confezione



MEZCLA SÓLIDA DE Ca Y Mg (15-5) CON BORO (B) Y MOLIBDENO (Mo)

MISCELA SOLIDA DI Ca E Mg (15-5) CON BORO (B) E MOLIBDENO (Mo)

ABONO DE MEZCLA / CONCIME IN MISCELA

CORRECTOR DE CARENCIAS DE CALCIO (Ca) Y MAGNESIO (Mg)

CORRETTORE DI CARENZE DI CALCIO (Ca) e MAGNESIO (Mg)

PER APPLICAZIONI FOLIARI E FERTIRRIGAZIONE

RIQUEZAS GARANTIZADAS / RICCHEZZA GARANTITA:

Oxido de calcio (CaO) soluble en agua	15 % p/p
Oxido de calcio (CaO) soluble en agua	
Oxido de magnesio (MgO) soluble en agua	5 % p/p
Oxido de magnesio (MgO) soluble en agua	
Óxido de magnesio (MgO) complejo por ácido lignosulfónico	1 % p/p
Óxido de magnesio (MgO) complejo con ácido lignosulfónico	
Boro (B) soluble en agua	0,9 % p/p
Boro (B) soluble en agua	
Molibdeno (Mo) soluble en agua	0,3 % p/p
Molibdeno (Mo) soluble en agua	

Intervallo de pH que garantiza una buena estabilidad de la fracción complejada: 1-9

Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione complessata: 1-9

LEER ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

LEGGERE ATTENTAMENTE L'ETICHETTA PRIMA DEL SUO IMPIEGO.

APLICACIONES Y DOSIS / APPLICAZIONE E DOSAGGI:

Mag-Cal puede ser aplicado foliarmente en diversos cultivos, tanto arbóreos como herbáceos. **Mag-Cal** può essere applicato per via fogliare e fertirrigazione su tutte le colture come da tabella.

NOTA IMPORTANTE:

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La empresa garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

Le raccomandazioni ed informazioni riportate in questa etichetta sono il frutto di ampi e rigorosi studi così come di prove in campo. Tuttavia, nel momento dell'impiego del formulato, potrebbero intervenire una serie di fattori che esulano dal nostro controllo (preparazione della miscela, applicazioni, climatologia...). L'azienda garantisce la composizione, formulazione ed il contenuto. L'utilizzatore sarà l'unico responsabile dei danni causati (mancanza di efficacia, tossicità in generale, residui...) dalla inosservanza totale o parziale delle istruzioni riportate in etichetta.

Questo prodotto è legalmente autorizzato in España, secondo il Real Decreto 506/2013 e viene immesso nel mercato italiano in base al principio di mutuo riconoscimento ai sensi del Regolamento CE n. 2019/515.

FERTIRRIGAZIONE: La dose generale di applicazione è di 10-20 kg/ha in funzione della coltura e ripartendolo in varie applicazioni a seconda del ciclo culturale della pianta.

CONTENIDO NETO:
CONTENUTO NETTO:

5 Kg