

Cordial®

INSETICIDA

CONCENTRADO PARA EMULSÃO (EC)

CONTENDO: 18,61 g/l ou 2% (p/p) de piretrinas

Para controlo de afídeos, moscas brancas e tripses em pepino, pimenteiro, tomateiro, crisântemo, pelargónio e roseira (todas as culturas em estufa)

Autorização de venda n.º 1220 concedida pela DGAV

Lote e data de fabrico: Ver marcado impresso



ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL. PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO. MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. LER O RÓTULO ANTES DA UTILIZAÇÃO.



ATENÇÃO

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

P261 Evitar respirar a nuvem de pulverização.

P262 Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P273 Evitar a libertação para o ambiente.

P391 Recolher o produto derramado.

P405 Armazenar em local fechado à chave.

P501 Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

Para proteção do aplicador, este deve usar: Luvas de proteção química durante a mistura/calda, aplicação, manuseamento e limpeza do equipamento de aplicação. Vestuário de proteção tipo 6 durante a aplicação e a limpeza do equipamento de aplicação.

SPo2 Depois da utilização do produto, lavar todo o vestuário de proteção.

SPo5 Arreganhar as estufas tratadas até à secagem do pulverizado antes de nelas voltar a entrar.

SP1 Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.

Devido ao risco que este produto constitui para artrópodes não visados, utilizar apenas em estufa e não utilizar no controlo biológico de pragas.

SPe8 Perigoso para as abelhas. Para proteção das abelhas e de outros insetos polinizadores, não utilizar este produto durante o período de presença das abelhas nos campos. Remover ou cobrir as colmeias durante a aplicação do produto e durante 24 horas após o tratamento.

Intervalo de segurança: 1 dia em pepino em estufa, pimenteiro em estufa e tomateiro em estufa.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos.

Tel.: 808 250 143.

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de receção Valorfito; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.



CARACTERÍSTICAS: CORDIAL® é um inseticida biológico de amplo espectro de ação, baseado num extrato de flores dessecadas de *Chrysanthemum cinerariaefolium* cujos ácidos, crisântémico e piretrínico, formam a cinerina, a piretrina e a jasmolina.

CORDIAL® possui rápida ação, atuando por contacto nos canais de sódio do sistema nervoso dos insetos. Adicionalmente possui efeito repelente sobre os insetos.

UTILIZAÇÕES, CONCENTRAÇÕES/DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO: **PEPINO, PIMENTEIRO E TOMATEIRO (em estufa):** Afídeos (*Aphis gossypii*), mosca branca das estufas (*Trialeurodes vaporariorum*), moscas brancas (*Bemisia tabaci*), tripses da Califórnia (*Frankliniella occidentalis*) e tripses (*Thrips tabaci*): Aplicar 160 ml/hl, não excedendo a dose de 1,25 l/ha. Aplicar o produto no início da infestação. Realizar no máximo 3 aplicações por campanha, com intervalos de 7 dias. Utilizar um volume de calda de 600 a 1200 l/ha.

CRISÂNTEMO, ROSEIRA E SARDINHEIRA (em estufa): Afídeos (*Aulacorthum solani*, *Aphis gossypii* e *Myzus persicae*), mosca branca das estufas (*Trialeurodes vaporariorum*), moscas brancas (*Bemisia tabaci*), tripses da Califórnia (*Frankliniella occidentalis*) e tripses (*Thrips tabaci*): Aplicar 125-160 ml/hl, não excedendo a dose de 1,6 l/ha. Aplicar o produto no início da infestação. Realizar no máximo 3 aplicações por campanha, com intervalos de 7 dias. Utilizar um volume de calda de 600 a 1000 l/ha.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS: Efetuar a aplicação de manhã cedo ou ao final da tarde.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA: No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Juntar a quantidade de CORDIAL a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.

MODO DE APLICAÇÃO: Calibrar corretamente o equipamento, para o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (l/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entre-linhas) com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda.

A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as concentrações/doses indicadas.

Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda à concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.

NOTA: As recomendações e informação que facultamos são fruto de vastos e rigorosos estudos e ensaios. No entanto, na sua utilização, podem intervir numerosos fatores que escapam ao nosso controlo (preparação da calda, aplicação, climatologia, etc.). A empresa garante a composição, formulação e conteúdo. O utilizador será responsável pelos danos causados (falta de eficácia, toxicidade em geral, resíduos, etc.) por inobservância total ou parcial das instruções do rótulo.

Um produto de: **COPYR S.p.A.** - Via G. Stephenson, 29 - 20157 Milão (Itália) - Tel.: +39 02 390368.1

Distribuído por:



COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.

Vildomat 321, 5º, 08029 Barcelona (Espanha)

Tel. +34 93 495 25 00 - Fax +34 93 495 25 02

E-mail: masso@cqmasso.com - www.massoagro.com

Delegação de PORTUGAL: Rua de Ajuda, 65 - 4350-017 Porto

Tel.: +351 917 765 356 - Tel/Fax: +351 225 099 133 - E-mail: franito@cqmasso.com